



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 3618, ημερομηνίας 03/04/2014 για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
την επιστολή του αιτητή με ημ. 28/03/2014 για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στη Γαλλία,
την αρ. 496 (Έντυπο 09), για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, σε σχέση με τη σήμανση του σκευάσματος,
τις αιτήσεις με αρ. 3930 και 4876 (Έντυπο 08) για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **ΜΕΤΑΡΕΧ ΙΝΟV** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3097

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

31/05/2024

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/08/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

De Sangosse SA, Γαλλία

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L. Lambrou Agro Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. Lambrou Agro Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

2. Μορφή:

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Δοχεία	3Kg, 3.5Kg, 4Kg, 4.5Kg και 5Kg	HPDE
2	Σακούλα	5Kg, 10Kg, 12Kg, 15Kg, 20Kg και 25Kg	Χαρτόσακκος πολλαπλών στρώσεων
3.	Μεγάλη υφαντή σακούλα	200Kg	Πολυπροπυλένιο
4	Κουτί (με εσωτερική σακούλα)	200γρ., 250γρ., 400γρ., 500γρ., 600γρ., 750γρ., 800γρ., 1Kg και 1.5Kg	Κουτί χάρτινο/Σακούλα PE

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Κοχλιολειμακοκτόνο για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων Δρα από στομάχου. Μετά από τη λήψη του δολώματος και την αρχική υπερέκκριση βλέννας τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες χάνουν την κινητική τους ικανότητα, παραλύουν και πεθαίνουν.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Σκορπίζεται

- α) ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του εδάφους ή της καλλιέργειας (καθολική εφαρμογή),
- β) τοπικά πάνω στη γραμμή φυτών,
- γ) τοπικά μέσα στο αυλάκι κατά τη σπορά ή το φύτεμα
- δ) σε ανάμιξη με τον σπόρο.

Εφαρμόζεται κυρίως με μηχανοκίνητο διανομέα κοκκωδών σκευασμάτων με περιστρεφόμενους φυγόκεντρους δίσκους. Επιτρέπεται η εφαρμογή του και με το χέρι ιδιαίτερα σε μικρή έκταση εφαρμογής, σε καλλιέργειες θερμοκηπίου και/ή πάνω στη γραμμή.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Προϊόν έτοιμο προς χρήση

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόση Προϊόντος / εφαρμογή	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κιλά /δεκ. max.		
Υπαίθριες καλλιέργειες				
Αμπέλια, Εσπεριδοειδή, Ακρόδρυα, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Φράουλα, μικροί καρποί	Σαλιγκάρια Κοχλίες Γυμνο-σάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες)	α)Καθολική εφαρμογή 500 β)Πάνω στη γραμμή 500 γ)Σε ανάμιξη με τον σπόρο 400 δ)Στο αυλάκι σποράς 400	Καθολική εφαρμογή ή πάνω στη γραμμή φυτείας. Έως τέλος άνθησης/ BBCH69	4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 5 ημέρες
Πατάτα			Καθολική εφαρμογή. Έως 7 ημέρες πριν τη συγκομιδή/ BBCH97	
Λαχανικά (κραμβοειδή, φυλλώδη), Εδώδιμα αρωματικά φυτά			Καθολική εφαρμογή. Έως την έναρξη έκπτυξης των πλευρικών ματιών, του σχηματισμού κεφαλής ή ροζέτας/ BBCH40	
Αγκινάρα			Καθολική εφαρμογή. Έως την εμφάνιση της κεφαλής /BBCH39	
Νωπά ψυχανθή και Όσπρια			Καθολική εφαρμογή. Έως την έκπτυξη 5 φύλλων /BBCH15	
Ζαχαρότευτλα, κτηνοτροφικά τεύτλα και άλλα ριζωματώδη κηπευτικά, Αραβόσιτος, Γλυκοκαλάμποκο, Σόργο, Κεχρί			Στο αυλάκι σποράς ή καθολική εφαρμογή. Έως την έκπτυξη 5 φύλλων/ BBCH15	
Ελαιούχοι σπόροι (εκτός από αραχίδα)			Στο αυλάκι σποράς ή καθολική εφαρμογή. Έως την έκπτυξη 7 φύλλων /BBCH17	
Σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, τριτικάλε)			Σε ανάμιξη με τον σπορο ή καθολική εφαρμογή. Έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους / BBCH30	
Νέοι λειμώνες (σίκαλη)			Καθολική εφαρμογή. Έως την έκπτυξη 5 φύλλων /BBCH15	
Καλλωπιστικά φυτά και για δρεπτά άνθη, Γρασίδι			Καθολική εφαρμογή σε όλα τα στάδια	
Καλλιέργειες θερμοκηπίου				
Φράουλα	Σαλιγκάρια Κοχλίες Γυμνο-σάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες)		Καθολική εφαρμογή ή πάνω στη γραμμή φυτείας. Έως τέλος άνθησης/ BBCH69	4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 5 ημέρες
Μαρούλι και άλλα φυλλώδη λαχανικά, Αρωματικά φυτά			Καθολική εφαρμογή. Έως την έναρξη έκπτυξης πλευρικών ματιών, ή τον σχηματισμό κεφαλής ή ροζέτας /BBCH40	
Καλλωπιστικά φυτά και για δρεπτά άνθη			Καθολική εφαρμογή σε όλα τα στάδια	

Παρατηρήσεις:

- 1) Η συνιστώμενη **μέγιστη συνολική δόση είναι 1,75 κιλό προϊόντος ανά δεκάριο, ανά καλλιέργεια και ανά έτος** και ο **μέγιστος συνιστώμενος αριθμός εφαρμογών είναι 4 ανά καλλιεργητική περίοδο.**
- 2) Εφαρμόζεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο όταν τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες είναι σε έντονη δραστηριότητα, προληπτικά ή με τις πρώτες ζημιές στα φυτά.
- 3) Για την παρακολούθηση της προσβολής και την έγκαιρη εκτίμηση του κινδύνου προσβολής συνιστάται η χρήση ειδικών παγίδων.
- 4) Για καταπολέμηση των γυμνοσαλιάγκων να εφαρμόζεται πριν αναρριχηθούν στην κόμη του φυτού.
- 5) Εάν εφαρμόζεται με ανάμιξη με τον σπόρο η ανάμιξη αυτή πρέπει να γίνεται σχολαστικά πριν και κατά την εφαρμογή.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Εσπεριδοειδή, Ακρόδρυα, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμπέλια, Μικροί καρποί, Φράουλες	BBCH 69 (τέλος άνθησης)
Ζαχαρότευτλα κ.α. κτηνοτροφικά τεύτλα και ριζωματώδη κηπευτικά, Αραβόσιτος, γλυκοκαλάμποκο, σόργο, κεχρί, Νωπά ψυχανθή και όσπρια	BBCH 15 (5 φύλλα)
Λαχανικά (κραμβοειδή, μαρούλι κ.α.φυλλώδη), εδώδιμα αρωματικά	BBCH 40 (έναρξη σχηματισμού κεφαλής ή ροζέτας ή έκπτυξης πλευρικών ματιών)
Αγκινάρα	BBCH 39 (εμφάνιση της κεφαλής)
Ελαιούχοι σπόροι (εκτός από αραχίδα)	BBCH 17 (7 φύλλα)
Σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη, τριτικάλε)	BBCH 30 (έναρξη επιμήκυνσης στελέχους)
Πατάτα	7 ημέρες (5 φύλλα)
Νέοι λειμώνες (σίκαλη)	49 ημέρες πριν την επιστροφή των παραγωγικών ζώων ή πριν την κοπή των φυτών για βόσκηση

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: MO

Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν αναμένεται βροχή,
Να εφαρμόζεται με υγρό καιρό όταν τα σαλιγκάρια είναι περισσότερο δραστήρια

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την περιοχή εφαρμογής σε νέους λειμώνες (από σίκαλη) για τουλάχιστο 49 ημέρες (δηλ. 7 εβδομάδες) από την τελευταία εφαρμογή

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

Να χρησιμοποιείται μόνο του

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS08

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H361f Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα

EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση

P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης

P270 Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα

P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe6 Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια ζώα μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος. Κρατήστε μακριά τα κατοικίδια. Μην το τοποθετείτε σε σωρούς. Σκουπίστε και μαζέψτε αμέσως όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος.

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση των κενών μέσων συσκευασίας για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικά: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα κρατήστε τον ζεστό και ήρεμο. ΜΗ χορηγήσετε τίποτα από το στόμα εάν ο παθών δεν διατηρεί τις αισθήσεις του.

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό και δείξτε αυτή τη συσκευασία ή την ετικέτα.

P330+P331 Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P304+P341 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή και κρατήστε τον ζεστό.

P302+ P361 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.

P313+P332 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν και είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική και υποστηρικτική αγωγή.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 21/06/2024


(Κωνσταντής Σπανάσης)
Αν. Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας
Σφραγίδα