

Εντομοκτόνο - Ακαρεοκτόνο επαφής

# ACARIDOIL

Άλατα καλίου λιπαρών οξέων 13%

## 13SL



- Το ACARIDOIL 13SL καταστέλλει την ανάπτυξη των πληθυσμών των ακαρέων και των εντόμων που έχουν μαλακό εξωσκελετό:
  - με μηχανικό τρόπο δράσης
  - επεμβαίνοντας στην φυσιολογία τους.
- Το ACARIDOIL 13SL μπορεί να εφαρμοστεί σε εναλλαγή με εντομοκτόνα για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στις διάφορες ομάδες δραστικών.
- Το ACARIDOIL 13SL χρησιμοποιείται μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής καθώς η δραστική του, τα άλατα καλίου λιπαρών οξέων, εξαιρείται της θέσπισης ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 889/2008  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ



# ACARIDOIL 13SL

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ




Το **ACARIDOIL 13SL** έχει σχετικά περιορισμένη επίδραση σε θηρευτές και μία σχετικά καλή επιλεκτικότητα στα φυτοφάγα είδη. Οι ταχέως κινούμενοι θηρευτές και αυτοί που έχουν μεγάλο σώμα με ενισχυμένο εξωσκελετό καταφέρνουν να διαφεύγουν από τις επιδράσεις του ψεκασμού με το ACARIDOIL 13SL.



Ελαττώνει τους πληθυσμούς της Τούτας (*Tuta absoluta*)


Αποτελεσματικό στον έλεγχο του αλευρώδη (*Trialeurodes vaporariorum*) και (*Bemisia tabaci*)

Σε μελέτη αποτελεσματικότητας στον κοινό τετράνυχο (*Tetranychus urticae*) και των επιπτώσεων στο αρπακτικό άκαρι *Phytoseiulus persimilis* διαπιστώθηκε ότι ήταν άμεσα τοξικό στα ενήλικα φυτοφάγα ακάρεα και στις νύμφες τους και μέτρια τοξικό στα αυγά τους ενώ το αρπακτικό *Ph.persimilis* επηρεάστηκε πολύ λιγότερο. Παράλληλα προκάλεσε σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης του πληθυσμού του Τετρανύχου που προήλθε από τα επιβιώσαντα αυγά.



Μέση % θνησιμότητας των θηλυκών τετρανύχων σε 24, 48 και 72 ώρες μετά τον ψεκασμό σε φύλλα θερμοκηπιακών κηπευτικών.

# Εντομοκτόνο - Ακαρεοκτόνο επαφής



Μέσος αριθμός αυγών του κοινού τετράνυχου σε ψεκασμένα με ACARIDOIL 13SL φύλλα φασολιάς σε 24, 48 and 72 ώρες ωοτοκίας. Τα θηλυκά τοποθετήθηκαν μόλις τα ψεκασμένα φύλλα στέγνωσαν.



Το **ACARIDOIL 13SL** εξαλείφει τον κοινό τετράνυχου (*T. urticae*) την περίοδο αύξησης των πληθυσμών του χωρίς τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Το **ACARIDOIL 13SL** είναι ευθέως τοξικό στα τέλεια και τις νύμφες των τετρανύχων και μέτρια τοξικό στα αυγά τους (53, 8% θνησιμότης αυγών).



Για τον έλεγχο των αφίδων



Για τους θρίπες



Για τον έλεγχο των κοκκοειδών



# ACARIDOIL 13SL

## ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
<b>Εσπεριδοειδή</b> (Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Γκρέιπ φρούτ)	Αλευρώδης, Αφίδες Κοκκοειδή, e Coccidae), Θρίπες, Ακάρεα	1900 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	4
<b>Ακρόδρυα</b> (Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Καρυδιά)	Αφίδες, Θρίπες Κοκκοειδή, Ακάρεα	1900 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	4
<b>Μηλοειδή</b> (Μηλιά, Αχλαδιά)	Αφίδες, Κοκκοειδή, Θρίπες, Ψύλλα, Ακάρεα	1900 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	4
<b>Πυρηνόκαρπα</b> Βερυκοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά	Αφίδες, Θρίπες, Κοκκοειδή, Βαμβακάδα, Ακάρεα	1900 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	4
<b>Λαχανικά (Υ+Θ)</b> Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Φασόλι, Μπιζέλι, Κολοκυνθοειδή, Λάχανο, Κουνουπίδι	Αλευρώδεις, Αφίδες, Βρωμούσες, Θρίπες, Τούτα ( <i>Tuta absoluta</i> ), Ακάρεα	1500 -1900κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	4
<b>Καλλωπιστικά, Φυτά εσωτερικού χώρου</b>	Αφίδες, Θρίπες, Κοκκοειδή, Ακάρεα	1500 -1900κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	4
<b>ΑΜΠΕΛΙ</b> <i>Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας:</i>	Μετκάλφα, Θρίπα Καλιφόρνιας, Κοκκοειδή και Τετράνυχο	1500 -1900κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	4
<b>ΕΛΙΑ</b> <i>Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας:</i>	Ακάρεα, Κοκκοειδή, Κηκιδόμυγες, Πυραλίδα, Καλόκορη, Βαμβακάδα	1500 -1900κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	4
<b>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</b>			
<b>ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ (Υ) και ΦΡΑΓΚΟΣΤΑΦΥΛΛΑ (Υ) (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)</b> <b>ΣΕΛΙΝΟ, ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ, ΡΟΚΑ</b>	Αφίδες, Θρίπες, Τετράνυχοι	1500 -1900κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	4
<b>ΑΓΚΙΝΑΡΑ (Υ), ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ</b>	Αφίδες και Τετράνυχοι	1500 -1900κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	4
<b>ΜΠΡΟΚΟΛΟ</b>	Αφίδες, Αλευρώδεις και Ακάρεα	1500 -1900κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	4
<b>ΠΑΤΖΑΡΙ, ΣΕΣΚΟΥΛΑ (φύλλα), ΣΠΑΝΑΚΙ, ΡΑΔΙΚΙ</b>	Αφίδες και Θρίπες	1500 -1900κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	4
<b>ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΦΡΕΣΚΟ</b>	Αφίδες, Θρίπες και Αλευρώδεις	1500 -1900κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	4
<b>ΣΚΟΡΔΟ</b>	Θρίπες	1500 -1900κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	4
<b>ΦΑΚΗ</b>	Θρίπες και Ακάρεα	1500 -1900κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	4
<b>ΜΠΑΜΙΑ</b>	Αφίδες, Θρίπες, Αλευρώδεις και Ακάρεα	1500 -1900κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	4

Όταν γίνονται εφαρμογές χαλκών ή θείου, θα πρέπει να μεσολαβεί διάστημα 5 ημερών από τον ψεκασμό με ACARIDOIL 13SL.



**ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε., ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,**  
**ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ**  
28ο χλμ. Εθ. Οδ. Αθηνών-Λαμίας, 19014 ΑΦΙΔΝΕΣ  
Τηλ: 22950 45100, e-mail: info@viorylagro.gr  
www.viorylagro.gr

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14534/ 24-9-2015**

**ΠΡΟΣΟΧΗ**



**Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.**  
**Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.**  
**Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**