CupraBlau® Z 35 WG

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60.629/27-06-2017

Εγγυημένη σύνθεση: Μεταλλικός χαλκός 35% β/β σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού (copper oxychloride), βοηθητικές ουσίες: 38,60% β/β

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες • Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

• Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντι/προστατευτικά ενδύματα/μάσκα σιαμαγής προστασίας για τα μάτι/πρόσωπο. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές απαιτήσεις. • Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτα: • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εκπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εαν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να εκπλύνετε. • Εαν δεν υπομονεί ο ερεθισμός: ζητήστε συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα επιπτοσμένα με το φαγοπτικό μέρη δωμα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. • Σε περίπτωση κατάποσης: χορηγήστε νάνα ή νερό (για αρκετά) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση. • Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον πασόνια από το χώρο της έκθεσης διατηρώντε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό. **Αντίδοτος:** Πενικιλλαμίνη.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

• Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Απαγόρευτη τη ρύπανση μέσω των συστημάτων απορρόγγυσης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους). • Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μιαν αμάκοτη ζώνη προστασίας από επιφανειακά ύδατα: **i)** 10 μέτρων, σε αμπέλι, ακτινίδιά, σκαλοκοπή, κολοκυνθοειδή, μικρόκαρπα, βολβώδη λαχανικά, φυλλώδη λαχανικά, καπνό, κυπαρισσία, ανθοκομικά, καλλωπιστικά πατάξεις. **ii)** 10 μέτρων χρησιμοποιώντας ακροφύσια μείωσης εξάπλωσης 50% σε εστερεοειδή και ελιές. **iii)** 20 μέτρων χρησιμοποιώντας ακροφύσια μείωσης εξάπλωσης 50% σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα και ακρόδρυα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουπά αερού καταστραφούν προηγουμένως με σκόπιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Πεδίο εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Τρόπος & Χρόνος εφαρμογής-Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/αλληλεγγύτη περίοδοι μεσοδιαστήματα επεμβάσεων (ημέρες):

ΑΜΠΕΛΙ (για επιτραπεζία και οινοποιήσιμα σταφύλια): Για **Περονόσπορο, Φόμοψη** και **Μαύρη σήψη** με 170-190 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 170-190 γρ. ανά 100 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Ανάπτυξη των φύλλων-inflorescence emerge (BBCH 13-60). Μετά την άνθιση-ανάπτυξη των φρούτων μέχρι πριν τη συγκομιδή (BBCH 71-83). Μετά τη συγκομιδή και στην αρχή της άνοιξης (BBCH 99-12). Τοκικές εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες σε προληπτική βάση, 6 εφαρμογές/7-10 ημέρες.

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά): Για Φουσικλάδιο, Ασκομύκητα, Εξέλιξαση βραχόνων, Μονίλια, Σήψη λαιμού, Βακτηριακό κάψιμο, Ωίδιο: i) με 135-140 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 160-210 γρ. σε 120-150 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Βλάστηση/ανάπτυξη οφθαλμών (BBCH 00-03)/Φθινόπωρο/Χειμώνας. Εφαρμογές κατά το φθινόπωρο-χειμώνα και εξ'νλωσης 3 εφαρμογές/7-10 ημέρες. **ii)** με 110-115 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 130-170 γρ. σε 120-150 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Ανάπτυξη φύλλων/Βλαστοί (BBCH 07-54)/Άνοιξη. Εφαρμογές κατά τη βλαστική ανάπτυξη (διόγκωση οφθαλμών, πράσινη κορυφή, μπουμπουκιά). Διακένμε τις εφαρμογές κατά την έναρξη της ανάθρωσης 3 εφαρμογές/7-10 ημέρες. **iii)** με 40-50 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-75 γρ. σε 120-150 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Βακτηριακό κάψιμο: Εφαρμογές φθινόπωρο και νωρίς την άνοιξη σε μη χαλκευεισθήτης ποικιλίες 3 εφαρμογές/7-10 ημέρες.

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά): Για **Σήψη λαιμού** (*Phytophthora cactorum*) με 15-35 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 210 γρ. ανά 100 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Διαβρέχουμε πολύ καλά κάθε δένδρο στην περιοχή του λαιμού με 10-15 Λίτρα διαλύματος, 1 εφαρμογή.

Μουσμουλιά: Για **Φουσικλάδιο** με 140-190 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 140-230 γρ. σε 100-120 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Βλάστηση/ανάπτυξη οφθαλμών μέχρι ανάπτυξη φύλλων και βλαστών (BBCH 00-51)/ Φθινόπωρο/Χειμώνας. Διακένμε τις εφαρμογές κατά την έναρξη της ανάθρωσης, 4 εφαρμογές/7-10 ημέρες.

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά), Αμυγδαλιά: Για **Εξώασκο, Κορύνεο, Μονίλια, Κλαδοσπόριο, Κυλινδροσπόριο, Βακτηριακή εξέλιξαση πυρηνόκαρπων, Βακτηριακή αποσύνθεση ροδακινιάς, Βακτηριακή Ψώρα βερίκοκου** με 160-170 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 160-200 γρ. σε 100-120 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Βλάστηση/ανάπτυξη οφθαλμών (BBCH 00-03)/Φθινόπωρο/Χειμώνας. 4 εφαρμογές/7-10 ημέρες.

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά): Για **Σήψη λαιμού** με 20-40 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 170 γρ. ανά 100 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Διαβρέχουμε πολύ καλά κάθε δένδρο στην περιοχή του λαιμού με 10-15 Λίτρα διαλύματος, 1 εφαρμογή.

Εστερειδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ-φρουτ, Κιτρέα): Για **Σήψη λαιμού, Κομμίωση λαιμού, Φυτόφθορα, Καπνιά, Ανθράκνωση,** Βακτηριακή **εξέλιξαση εστερειδοειδών** με 140-210 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 140-210 γρ. σε 100 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Βλάστηση/ανάπτυξη οφθαλμών μέχρι ανάπτυξη φύλλων και βλαστών (BBCH 00-39)/Προανθικά και πριν ανοίξουν τα πρώτα λουλούδια (BBCH 51-57). Εφαρμογές από το τέλος Χειμώνα. 3 εφαρμογές/7-10 ημέρες.

Ελιά: Για **Κυκλοκόνιο, Καρκίνωση, Καπνιά** με 160-220 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 160-220 γρ. σε 100 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Βλάστηση/ανάπτυξη οφθαλμών μέχρι ανάπτυξη φύλλων (BBCH 00-19)/Χειμώνας/Ανάπτυξη καρπού (BBCH 71-75)/Φθινόπωρο Χειμώνα. Προληπτικές εφαρμογές κατά τις περιόδους που είναι πιο ευνοϊκές για τη νόσο. 3 εφαρμογές/7-10 ημέρες.

Ακτινίδιο: Για **i) Σήψη λαιμού, Αλτερνάρια, Βακτηριακή κηλίδα, Βακτηριακό έλκος** με 210 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 210 γρ. σε 100 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Επεμβάσεις μόνο στο καφέ μέρος. Βλάστηση/ανάπτυξη οφθαλμών (BBCH 00-08)/ φθινόπωρο/Χειμώνας. 2 εφαρμογές/7-10 ημέρες. **ii) Φαιά σήψη λαιμού, Σκάσιμο, Βακτηριακη φύλλων** με 110-140 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 110-140 γρ. σε 100 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Βλάστηση/ανάπτυξη οφθαλμών (BBCH 00-08), Φθινόπωρο/Χειμώνας, 5 εφαρμογές/7-10 ημέρες. **iii) Σήψη** λαιμού με 55-100 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 400 γρ. μανιτάρια. Διαβρέχουμε πολύ καλά κάθε δένδρο στην περιοχή του λαιμού με 10-15 Λίτρα διαλύματος, 1 εφαρμογή.

Ακρόδρυα: 2 εφαρμογές/7-10 ημέρες. Για **Σαράκι, Ανθράκνωση, Βακτηρίωση, Βακτηριακή νέκρωση, Βακτηριακό έλκος: i)** Καρυδιά, Φουντουκιά, Καστανιά, **Φιστικιά** με 160-170 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 160-170 γρ. σε 100 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Βλάστηση/ανάπτυξη οφθαλμών μέχρι ανάπτυξη φύλλων (BBCH 00-19)/Φθινόπωρο/Χειμώνας/Άνθιση. 2 εφαρμογές/7-10 ημέρες. **ii) Αμυγδαλιά** με 160-170 γρ. /100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 160-200 γρ. σε 100-120 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Βλάστηση/ανάπτυξη οφθαλμών μέχρι ανάπτυξη φύλλων (BBCH 00-19)/Φθινόπωρο/Χειμώνας/Άνθιση.

Μικρά σπυρωφόρα (Σμέουρο, Ρίμπες, Μύρτιλλο, Βατόμουρο, Φραγκοστάφυλλο): Για **Σεπτωριάωση** με 160-170 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 130-170 γρ. σε 80-100 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Βλάστηση/ανάπτυξη οφθαλμών μέχρι ανάπτυξη φύλλων (BBCH 00-19)/ Φθινόπωρο/Χειμώνας/Άνθιση. 2 εφαρμογές/7-10 ημέρες.

Τομάτα: Για **Περονόσπορο, Φυτόφθορα** λαιμού, **Βακτηριακή Στιγμάτωση,** Βακτηριακό έλκος με 140-160 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 140-160 γρ. σε 100 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Ανάπτυξη φύλλων μέχρι ανάπτυξη βλαστών (BBCH 19-29)/Φθινόπωρο/Χειμώνας/Άνθιση. Αρχίστε τις εφαρμογές πριν την εκδήλωση της νόσου και επαναλάβετε ανάλογα με τις ανάγκες. 4 εφαρμογές/7-10 ημέρες.

Μελιτζάνα: Για **σκασίσματα φρούτων ή ανθράκνωση** με 110-150 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 110-150 γρ. σε 100 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Ανάπτυξη φύλλων μέχρι ανάπτυξη βλαστών (BBCH 19-29)/Φθινόπωρο/ Χειμώνας/Άνθιση. 2 εφαρμογές/7-10 ημέρες.

Κολοκυνθοειδή i) (Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι) με βρύωσμο φλοιό (Υ+Θ), ii) (Καρπούζι, Πεπόνι, Κολοκύθα) με μη βρύωσμο φλοιό: Για **Περονόσπορο,** Ανθράκνωση, **Βακτηρίωση φύλλων** με 110-150 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 90-150 γρ. σε 80-100 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Ανάπτυξη φύλλων μέχρι ανάπτυξη βλαστών (BBCH 13-29)/Φθινόπωρο/Χειμώνας/Άνθιση. Αρίστε τις εφαρμογές πριν την εκδήλωση της νόσου και επαναλάβετε ανάλογα με τις ανάγκες. 2 εφαρμογές/7-10 ημέρες.

Βολβώδη λαχανικά (Σκόρδο, Κρεμμύδι, Ασκαλώνιο, Φράσκο κρεμμύδι Shallot): Για **Περονόσπορο** με 110-150 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 70-150 γρ. σε 80-100 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Φθινόπωρο/Χειμώνας/Άνθιση. Ξεκινήστε εφαρμογές κατά την εμφάνιση συνθηκών ευνοϊκών για τη νόσο. 5 εφαρμογές/7-10 ημέρες.

Μαρούλι και πράσινα: φυλλώδη λαχανικά (Εσκαρόλη, **Αντίδι,** Ραντίτσιο, **Ρόκα,** Σπανάκι): Για **Περονόσπορο,** Αλτερνάρια**ση, Βακτηριακή σήψη,** Βακτηριακό έλκος με 110-150 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 70-150 γρ. σε 60-100 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Φθινόπωρο/Χειμώνας/Άνθιση. Οι εφαρμογές γίνονται με την εμφάνιση συνθηκών ευνοϊκών για τη νόσο. 5 εφαρμογές/7-10 ημέρες.

Λάχανο, Μπρόκολο, Κουνουπίδι: Για **Περονόσπορο, Μυκοσφαιρέλλα, Αλτερνάρια**ση, **Μαύρη σήψη** με 110-150 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 60-100 γρ. σε 70-150 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Φθινόπωρο/Χειμώνας/Άνθιση. Οι εφαρμογές γίνονται με την εμφάνιση συνθηκών ευνοϊκών για τη νόσο. 5 εφαρμογές/7-10 ημέρες.

Φρέσκα φασολάκια, Αμπελοφάσουλο, Φασόλι, Μπιζέλι, Φάβα: Για **Ανθράκνωση, Περονόσπορο, Βακτηρίωση, Βακτηριακό έλκος** με 110-150 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 60-100 γρ. σε 70-150 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Φθινόπωρο/Χειμώνας/Άνθιση. Οι εφαρμογές γίνονται με την εμφάνιση συνθηκών ευνοϊκών για τη νόσο. 5 εφαρμογές/7-10 ημέρες.

Τρικνταρωλλά, Γαρδαρολλά, Γεράνι, Χρυσάνθεμο, Κυκλάμινο κλπ, Πικροδάφνη, Δαφνοκερασιά: Για **Περονόσπορο, Φουσικλάδιο, Αλτερνάρια**ση, **Μαρασμός δαφνοκερασιάς, Καπνιά, Βακτηρίωση** με 110-150 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 70-150 γρ. σε 60-100 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Φθινόπωρο/Χειμώνας/Άνθιση. Οι εφαρμογές γίνονται με την εμφάνιση συνθηκών ευνοϊκών για τη νόσο. 2 εφαρμογές/7-10 ημέρες.

Κυπαρίσσι: Για **Έλκος** με 290-360 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 230-360 γρ. σε 80-100 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Προληπτικές θεραπείες στον κορμό και το φύλλωμα που προμηκοποιούνται άνοιξη και φθινόπωρο. 3 εφαρμογές/7-10 ημέρες.

Πατάτα: Για **Περονόσπορο, Αλτερνάρια**ση, **Βακτηρίωση** με 170-210 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 170-210 γρ. σε 100 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Ανάπτυξη φύλλων μέχρι ανάπτυξη καρπών (BBCH 12-81)/Φθινόπωρο/ Χειμώνας/Άνθιση. Οι εφαρμογές γίνονται με την εμφάνιση συνθηκών ευνοϊκών για τη νόσο. 4 εφαρμογές/7-10 ημέρες.

Καπνός: Για **Περονόσπορο, Φυτόφθορα** με 140-180 γρ./100 Λίτρα ψεκ. υγρού ή 140-180 γρ. σε 100 Λίτρα ψεκ. υγρούτρέμματα. Ανάπτυξη φύλλων (BBCH 11-19). Οι εφαρμογές γίνονται με την εμφάνιση συνθηκών ευνοϊκών για τη νόσο. 2 εφαρμογές/7-10 ημέρες.

Παραπήρηση: Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα ανάρκειας σε μεταλλικό χαλκό).

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη φυτοσκοπική περιοχή για 15 μέρες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε ανεδόυσης τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.

Καθορισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βαρέλι. Εκπλύνετε το βαρέλι και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια εκπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: Δεν είναι συμβατό με φυτοφάρμακα οξινολικής αντίδρασης.

Φυτοτοξικότητα: Στα ραδάκια, τα δαμάσκηνα και σε ευαίσθητες ποικιλίες μήλων και αχλαδιών το προϊόν μπορεί να είναι φυτοτοξικό εφόσον εφαρμόζεται σε πλήρη βλάστηση.

Ευαίσθητες ποικιλίες μήλων: Abbondanza, Bellfort, Black Stayman, Gravenstein, Rome beauty, Morgendutt, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, REmita del Canada, Rosa Mantovana, Commercio. Ευαίσθητες ποικιλίες αχλαδιών: Abate Fetel, Buona Luigia d' Avranches, Butirra Clairgeau, Passacessana, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Gifard. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ακρόδρυα, Εστερειδοειδή, Ακτινίδια, Μελιτζάνα, Καπνός: **Μη εφαρμόσιμο (Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή).** Μύρτιλλο, Ρίμπες, Σμέουρο, Βατόμουρο, Φραγκοστάφυλλο, Βολβώδη λαχανικά, Τομάτα, Κολοκυνθοειδή με βρύωσμο φλοιό, Φρέσκα φασολάκια, Αμπελοφάσουλο, Φασόλι, Μπιζέλι, Φάβα: **3 ημέρες.** Αμπέλι (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): **21 ημέρες.** Ελιά, Πατάτα, Λάχανο, Μπρόκολο, Κουνουπίδι: **14 ημέρες.** Φυλλώδη λαχανικά, Κολοκυνθοειδή με μη βρύωσμο φλοιό: **7 ημέρες.** Τομάτα βιομηχανική: **10 ημέρες.**

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παραγωγής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΗΜ. ΠΑΡΑΓ.ΗΜ ΛΗΞ.: *Βλέπε επί της συσκευασίας*

201908

5 120628 4 200296

Bio Βιολογική Καλλιέργεια
(Σύμφωνα με τον κανονισμό: ΕΚ αριθ. 889/2008)

Καθαρό Βάρος: **1 κιλό**

Προϊόν:
CINKARNA
Metalurško-kemična Industrija Celje, d.d.
Kidričeva 26, 3001 Celje, Slovenija
Tel: +386 (0)3 427 60 00

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: *FARMA-CHEM SA*
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ - Γ' ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026
570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047
info@farmachem.gr

Μέλος του: ECCA european crop care association

ISO 9001 Η **FARMA-CHEM SA** εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

www.farmachem.gr

FARMA-CHEM SA