

Πρώτες βοήθειες -Αντίδοτο:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΡΩΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΗΡΑΞΕΙΩΝ ή συμβουλευτείτε γιατρό, σε περίπτωση αδυναμίας. Ξεπλύνετε το στόμα.

Βγάλτε τα μάγουλα μόλις και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε με άφρονο νερό και σαπούνι.

Εάν παρουσιάσει ερυθρότητα το δέρμα ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επικοινωνήστε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εφόσον είναι δυνατόν, αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

Εάν δεν υπάρχει ο ορθολογικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επικοινωνήστε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΣΤΙΩΣΗΣ: Μεταφέρετε το προϊόν στο καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε όση που δικαιολογεί την αντανάη.

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΗΡΑΞΕΙΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδυναμία.

Παροχές για τον γιατρό: Συμπτώματα: ερυθρότητα, όδημα, ναυτία, ίκτερος, δύσπνοια, περιφερική κνίδωση, υπερερμία, ταχυκαρδία, σπασμοί, και ανανεωτική παράλυση. Πιθανότητα χρόνιας βλάβης και ως εκ τούτου, εκτός από τα προηγούμενα συμπτώματα, μπορούν να δηλωθούν γλυκερική ασημί, καταρρακτική, ψέλαση, αύξηση του μεταβολικού ρυθμού, απώλεια βάρους και νεφρικές από συληνγραφική νέκρωση.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία, καταπολέμηση της υπερθερμίας με ψύξη κλιμακωτά στις μέρες των άφρων.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΗΡΑΞΕΙΩΝ: 1401

Δηλώσεις προφυλάξης:

● Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. ● Μακριά από θερμά/ηλεκτρικά/φλόγιες/θερμικές πηγές. ● Αποφύγετε να αναπνεύσετε / αναβήσετε / αερίσει / σταγονίδια / ατμούς / ανακωσάματα.

● Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. ● Μην κλύετε, ενυδατεί, ή καθαρίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. ● Νο φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα μέσα σωματικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φορέση. Φοράτε γάντια και ολοήμερη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επικίνδυνου στο χώρο εφαρμογής, μετά τον ψεκασμό να φοράτε ολοήμερη φόρμα εργασίας. ● Διαβάστε την πιεζομετρική/περική σύσταση με την ετήσια γυμνασία. ● Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Νο μνη πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Νο απορρίψτε ή μάλισμα μέρη των συστημάτων αποχέτευσης από τις λυόμενες επιφάνειες και τους δρόμους. ● Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους, πλύνετε από τις γειτονικές καλλιέργειες, πριν αερίσετε ζώνη προστασίας 5 μέτρων, στις εφαρμογές που γίνεται χωρίς στην καλλιεργητική περίοδο. ● Για την προστασία των υδάτινων οργανισμών πρέπει από τα επιφανειακά ύδατα.

● **Αμλιές:** μίν αερίσετε ζώνη προστασίας 12 μέτρων, εκ των οποίων τα 10 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανδύσεως, σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυμίου μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους, κατά 67,5%. ● **Κοκοκύβη, αγουρί, πεπόνι, καρπούζι και φρούλα:** μίν αερίστε ζώνη ανδύσεως 10 μέτρων. ● **Μηλίς:** μίν αερίσετε ζώνη προστασίας 20 μέτρων, σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυμίου μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 67,5%.

ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΟΤΗΜΑ:

ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΧΘΡΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΧΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: (N=Υπάλινη, Θ=Θερμοκρασία): **Μηλίς** για Δίοδο (Podosphaera leucotricha), **Αγουρί (Y&Θ)**, **Κοκοκύβη (Y&Θ)**, **Καρπούζι (Y&Θ)**, **Πεπόνι (Y&Θ)**, Δίοδο (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum), **Φρούλα (Y&Θ)** Δίοδο Podosphaera maculata με 60κ.εκ (max) ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ή 60 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά δεκάριο (max).

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Μηλίς: Από την αρχή της ανάπτυξης των φύλλων έως τη φάση της ανθοφορίας. (BBCH 10-60). Αγουρί (Y&Θ), Κοκοκύβη (Y&Θ), Καρπούζι (Y&Θ), Πεπόνι (Y&Θ): Εφαρμόζεται από το στάδιο των 5 φύλλων έως και 3 ημέρες πριν τη συγκομιδή. (BBCH 15-85). Φρούλα (Y&Θ): Εφαρμόζεται από την εμφάνιση της τρυβνιάς έως και 3 ημέρες πριν τη συγκομιδή. (BBCH 55-87).

AR. ΠΑΡΤΗΜ. ΠΑΡΑΓ/ΗΜ ΛΗΕ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

QUIPRE

Γαλακτωματοποίηση Υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: Mερθυλινόσκαρ 35% β/ο - Βοηθητικές ουσίες: 60,42% β/β

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΔΕΙΑΣ.: 3735-P
ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΘΡΑΨΑΣ: ΑΑΔΑ: ΚΑΡΑΘΑΝΕ STAR 3645 - ΙΤΑΛΙΑ: 12886

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

Μικητοκτόνο επαφής με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση ενάντια στο **ώδιο αμπελιού, αγουριού, κολοκυθίου, καρπούζιού, πεπονιού, φρούλας και μηλιάς**. Εμφανίζει πολυθετική δράση, στο επίπεδο της κυτταρικής αναπνοής παρεμποδίζοντας την αύξηση του μικηλιού καθώς και την παραγωγή και βλάστηση των κοκκιδίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

● Επικίνδυνο για άτομα. ● Επιδράσεις σε περίπτωση κατάστασης. ● Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. ● Προκαλεί σοβαρά ορθολογικά ερεθίσματα. ● Επιδράσεις σε περίπτωση εστιασής. ● Μπορεί να προκαλέσει υπηλιξη ή ζώνη. ● Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνια επιπτώσεις. ● Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει εθισμό δερματίτις το σκόμμο. ● Για να αποφευχθεί τοξικό κινδύνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κατάχος της άδειας-Υπευθύνος για την τελική διάθεση στην αγορά :

Κεντρικά Γραφεία - Αποθήκες:
096400 11, Βιομ. Περιοχή Ιδαίου
2540, Δάλι, Λευκωσία - Κύπρος
Ταχ. Διεύθυνση: P.O. Box 24839
1304 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22667908, Fax: 22667157
email: info@lambrouagro.com.cy
www.lambrouagro.com.cy



Παροσκευαστής:
Dow Agrosciences Italia SII ITA/AMZ

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο /Μεσοδίοτητα: Μηλίς: 3/7-10. Αγουρί (Y&Θ), Κοκοκύβη (Y&Θ), Καρπούζι (Y&Θ), Πεπόνι (Y&Θ), Φρούλα (Y&Θ): 3/10.

Αμλιές* (Ονομαστικό και επηρεάζει) για Δίοδο (Podosphaera leucotricha) με 40-60κ.εκ (max) ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ή 40-60 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά δεκάριο (max) μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδίοτητα 10 ημερών / για προληπτικές και θεραπευτικές εφαρμογές: Από το στάδιο των 3 φύλλων μέχρι την αλλαγή χρώματος των ραγών. (BBCH 13-81), και με 60κ.εκ (max) ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ή 60 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά δεκάριο (max) μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδίοτητα 5-6 ημερών / σε ελαιώδεις εφαρμογές: Από την έναρξη της ανάπτυξης των βλαστών μέχρι την αλλαγή χρώματος των ραγών. (BBCH 71-81).

Παρατηρήσεις: *Στο πλαίσιο μέγιστου αριθμού εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο είναι 4. Σε περίπτωση ανάγκης εξοντωτικών επεμβάσεων μην εκτελείτε πάνω από 2 ψεκασμούς ανά 5-6 ημέρες, και πάνω από 2 προληπτικούς /θεραπευτικούς ψεκασμούς ανά 10 ημέρες. Η έναρξη εφαρμογής καθορίζεται σε σχέση με την προεβλητή των προηγούμενων ετών. 1. Η δόση του σκευάσματος δεν πρέπει να ξεπερνάει την προτεινόμενη (60 κ. εκ. σκευάσματος/δεκάριο). 2. Μην ψεκάζετε αντίθετα στον άνεμο. 3. Το σκευάσμα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σκόμμο και σε σχετικά χαμηρές θερμοκρασίες. 4. Το QUIPRE δεν βλάπεται από βροχή εάν περάσει μια ώρα από την εφαρμογή και έχει στεγνώσει η φυλλική επιφάνεια. 5. Το QUIPRE παρουσιάζει υψηλή τοληρότητα στα Tychiusatus βηη και Karthodophilus absestans και μπορεί να συμπεριληφθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης της αμπελιάς.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής φυτώσεως ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκατέσει: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το QUIPRE με δραστική ουσία το μερθυλινόσκαρ, που έχει μονοδικό μηχανισμό δράσης/ομάδα FRAC 29, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στη διαχείριση ανθεκτικότητας σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα με εδαφικό/αερίσιο τρόπο δράσης στα πλαίσια ενός προγράμματος προστασίας από το ώδιο.

Χρονικά διαστήματα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογών και της προέλευσης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκευάσμα: Όταν έχει σταθμάσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στο φυτό. **Σταχεία αυτοκατάσβεση, ευαισθησία μικρών και κάθε άλλης παρενεργείας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν παρουσιάζει αυτοκατάσβεση όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης στην επέκταση της προστασίας και στις ελλειψικές εξαρτηματολογικές συνθήκες - Για την αποφυγή πιθανών επιπτώσεων, τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες (>30° C), να ψεκάζεται τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας.

Τελειώσιμη επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά στον προέκτη για μεταλλοκατασκευής χρήσης (βιόσφαιρα): Αμλιές (ονομαστικό και επηρεάζει):2/1 Αγουρί, Καρπούζι (Y & Θ) Κοκοκύβη, Πεπόνι, Φρούλα (Y & Θ):3. Μηλίς: 3 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, ερμητικά κλειστό, σε χώρο προστατευμένο από πνεύρο, βροσάρα, έδαφος και καλά αερίζομενο, μακριά από παλιές συσκευασίες και θερμότητα. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια από την αναρρόφηση ημερησίως παρασκευής.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός κολυμικών των φυτών.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος έως τα 3/4 και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αναδύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδύση.

Καθαρμένες ψεκαστικές: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βάζο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομυρμακίσει όλα τα μέρη του σκευάσματος και θερμότητα. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια από την αναρρόφηση ημερησίως παρασκευής.

Συνδυαστικότητα: - **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τρίπλο ξεπλύμα (να νερό του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταπολεμήσουν προηγούμενος με τρίπλο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα αναποδοτιστούν όλα σε σημείο συλλήψεως για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Δεδομένο Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί

Περιεχόμενο: 500 κ.εκ.