



Εντομοκτόνο επαφής της ομάδας των φυσικών πυρεθρινών. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, προκαλώντας αρχικά κατάρρευση και στην συνέχεια τον θάνατό τους.

ΠΥΡΕΘΡΟ ΒΙΟΡΥΛ 5SC

Υδατικό Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC) - Pyrethrins (πυρεθρίνες) 5%



ΠΥΡΕΘΡΟ ΒΙΟΡΥΛ 5SC

Pyrethrins (πυρεθρίνες) 5%



Το **ΠΥΡΕΘΡΟ ΒΙΟΡΥΛ 5SC** είναι ένα ευρέως φάσματος Εντομοκτόνο με άμεσο Knockdown, με ήπιο τοξικολογικό προφίλ και με εφαρμογή και στην Βιολογική Γεωργία.


Εγγυημένη σύνθεση: pyrethrins 5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 89,96% β/β



Το ΠΥΡΕΘΡΟ ΒΙΟΡΥΛ 5SC είναι κατάλληλο για την Βιολογική Γεωργία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 889/2008 της επιτροπής της 5ης/9/2008

Τρόπος δράσης των φυσικών πυρεθρίνων


Το εκχύλισμα των φυσικών πυρεθρίνων από τα άνθη του χρυσανθέμου "Chrysanthemum cinerariaefolium" είναι ευρέως φάσματος εντομοκτόνο επαφής. Διεσθύνοντας στο σώμα των εντόμων επάγει την υπερδιέγερση του νευρικού συστήματος με αποτέλεσμα την ακανόνιστη και αυξημένη κίνηση που οδηγεί ταχύτατα σε παράλυση. Για αυτές τις ιδιότητές του το εκχύλισμα του πυρέθρου χρησιμοποιείται ως εντομοκτόνο εδώ και πάνω από έναν αιώνα.



Στο εκχύλισμα από τα άνθη απαντώνται σε ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση έξι διακριτές πυρεθρίνες, η πυρεθρίνη I και II, η συνερίνη I και II και οι γιασμολίνη I και II. Λόγω της χημικής πολυπλοκότητας αυτού του φυσικού μείγματος, τα έντομα δυσκολεύονται να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στο φυτικό εκχύλισμα.

- Το **ΠΥΡΕΘΡΟ ΒΙΟΡΥΛ 5SC** έχει άμεση εντομοτοξικότητα και μεγαλύτερη διάρκεια δράσης σε σχέση με άλλα σκευάσματα πυρέθρου.
- Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται οι ψεκασμοί να γίνονται σε ώρες της ημέρας με χαμηλή ηλιοφάνεια.
- Το διάστημα από την τελευταία εφαρμογή μέχρι την συγκομιδή είναι 2 ημέρες.

% μείωση πληθυσμού των νυμφών του αλευρώδη σε θερμοκηπιακό αγγούρι με το ΠΥΡΕΘΡΟ ΒΙΟΡΥΛ 5SC



Θρίπας



Αλευρώδεις



Δορυφόρος



Αφίδες

ΠΥΡΕΘΡΟ ΒΙΟΡΥΛ 5SC

Pyrethrins (πυρεθρίνες) 5%

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	κ.εκ/ στρέμμα (min -max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	
Τομάτα (Θ)	Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) Τούτα (<i>Tuta absoluta</i>)	60 -90	30-108	50-120	3/7
Μελιτζάνα (Θ)	Δορυφόρος της πατάτας (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>) Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) Θρίπες (<i>Thrips sp.</i>)	60 -90	30-90	50-100	3 /7
Καλλωπιστικά φυτά εσωτερικού χώρου	Θρίπες (<i>Thrips tabaci</i>) Αφίδες (<i>Aphis sp.</i>) Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>)	60	30-60	50-100	2 /7
Τριανταφυλλιά	Θρίπες (<i>Thrips sp.</i>)	60	30-60	50-100	2/7

ΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΣΚΟΠΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ.



Αρ. Αδείας διάθεσης στην αγορά: 14.536/ 5-10-2015
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.



ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
28 Χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, 190 14 Αφίδνες Αττικής,
Τηλ.: 22950 45100, Fax: 22950 45250
e-mail: vioryl@vioryl.gr, web site: <http://www.vioryl.gr>