



FARMA - CHEM SA

Τ.Θ. 1026 ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 - 569 630 έως 33 FAX: 2310 - 797 047
<http://www.farmachem.gr>, e-mail: info@farmachem.gr

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΠΡΟΪΟΝ: VIORMON PLUS

Το VIORMON PLUS είναι υγρό λίπασμα ανόργανων στοιχείων με ιχνοστοιχεία για την ανάπτυξη των ανθέων, των βλαστών και των καρπών. Είναι χρήσιμο σε όλα τα στάδια των φυτών.

pH: 6,5-7,8 & **Αγωγιμότητα:** 8,2 mS/cm

Σύνθεση:

Ολικό άζωτο 6% β/β (Νιτρικό άζωτο 3,1% β/β – Αμιδικό άζωτο 2,9% β/β), Βόριο 0,062% β/ο.

Περιέχει επίσης: Θειαμίνη (Βιταμίνη Β1): 0,1% β/ο & Νικοτινικό οξύ (Βιταμίνη Β3): 0,1% β/ο.

Συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./100 λίτρα νερό	Χρόνος Εφαρμογής
Οπωροφόρα δέντρα (Ελιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά)	Για την ανάπτυξη των ανθέων, των φύλλων, των βλαστών και των καρπών.	20-40	Μπορούν να αρχίσουν από την αρχή της βλάστησης και να συνεχιστούν μέχρι και 7 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Διενεργούνται 5-6 ψεκασμοί ετησίως.
Αμπέλι	»	20-40	Ένας ψεκασμός πριν την άνθηση και 2- 3 ψεκασμοί μετά την άνθηση μέχρι και 7 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

Σταφίδα	»	20-40	1 ^{ος} ψεκασμός πριν την άνθηση, 2 ^{ος} ψεκασμός όταν οι ρώγες είναι 2-4mm.
Βαμβάκι	»	20-40	1 ^{ος} ψεκασμός μόλις βγούν τα τέσσερα πραγματικά φύλλα. 2 ^{ος} ψεκασμός λίγο πριν την άνθηση & 3 ^{ος} ψεκασμός αφού δέσουν αρκετά καρύδια.
Τεύτλα	»	20-40	2-3 ψεκασμοί μέχρι να μεγαλώσει το ρίζωμα
Κηπευτικά (Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Κρεμμύδι, Αγγούρι, Καπούζι, Πεπόνι, Κολοκύθι)	»	20-40	1 ^{ος} ψεκασμός πριν την άνθηση και 3-4 ψεκασμοί στο διάστημα από την καρπόδεση μέχρι τη συγκομιδή
Φράουλα θερμοκηπίου	»	20-40	1 ^{ος} ψεκασμός τον Μάρτιο και όταν δεν αναμένεται παγετός. Επανάληψη κάθε 15 ημέρες.
Πατάτες	»	20-40	2 ψεκασμοί πριν από την άνθηση και 2-3 ψεκασμοί στο γέμισμα των κονδύλων

Καπνός	»	15-30	Μπορούν να γίνουν ψεκασμοί κάθε 10 ημέρες αρχίζοντας από το σπορείο και κάνοντας τουλάχιστον 3-5 ψεκασμούς
--------	---	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί φυλλώματος.

Παρατηρήσεις:

- Κατά τον ψεκασμό, καλύπτουμε όλη την επιφάνεια του φυλλώματος.
- Σε διαφυλλικές εφαρμογές θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ελάχιστη δόση όταν η θερμοκρασία και η ηλιοφάνεια βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με όλα τα σκευάσματα εκτός από θειικό χαλκό. Να αποφεύγεται η χρήση του σε συνδυασμό με χαλκούχα σκευάσματα

Περίπτωση που συνιστάται ή επιτρέπεται η χρήση του προϊόντος:

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται παραπάνω. Συνιστάται η χρήση του με γιββεριλλικό οξύ (π.χ. Gibrol 9TB).

Συνθήκες αποθήκευσης:

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο και σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 30°C.

Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.