



Η εξερεύνηση της φύσης δεν σταματάει ποτέ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΣΠΟΡΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
2022-2025



“Συνεχίζουμε να εξερευνούμε τις αγορές
για να σας προσφέρουμε τις καλύτερες ποικιλίες”



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εταιρεία L. Lambrou Agro Ltd ιδρύθηκε το 1978, με την επωνυμία «Λάμπρου και Ζορλάκης Λτδ». Από την ίδρυσή της η εταιρεία έχει επιτύχει μια σταθερή ανάπτυξη κατακτώντας ηγετική θέση στους τομείς της Γεωργίας, Κήπου και Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο.


Το 2006 η εταιρεία μετονομάστηκε σε L. Lambrou Agro Ltd. Το λογότυπο της εταιρείας έχει ως κύριο χρώμα το πράσινο συμβολίζοντας ζωτικής σημασίας έννοιες όπως αρμονία, φρεσκάδα, γονιμότητα και επιτυχία. Ως επίσης και το σύνθημά της είναι «Green is Life». Η L. Lambrou Agro Ltd έχει σήμερα τη μεγαλύτερη γκάμα γεωργικών προϊόντων στην Κυπριακή αγορά που περιλαμβάνει λιπάσματα, σπόρους, φυτοφάρμακα, βιοκτόνα, φυτοκώματα, μηχανήματα κήπου, ψεκαστήρες, δίκτυα γεωργικών εφαρμογών και χορτοδεσίσας, φιλμ θερμοκηπίου και ενσίρωσης, γλάστρες, είδη ατομικής προστασίας κ.ά.

Κατέχει ηγετική θέση στην αγορά της Κύπρου με κορυφαίες ποικιλίες επαγγελματικών σπόρων λαχανικών της Ολλανδικής εταιρείας BEJO, ως αποτέλεσμα μιας καθόλα επιτυχημένης συνεργασίας πέραν των 20 ετών.

Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου όπως επίσης και οι κεντρικές αποθήκες. Διαθέτει έντεκα καταστήματα στη Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα, και ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Η L. Lambrou Agro Ltd εργοδοτεί σήμερα περισσότερα από 70 άτομα προσωπικό (πέραν των 20 γεωπόνων) και είναι πιστοποιημένη με Σύστημα Ποιότητας ISO 9001 και Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία ISO 45001.

L. Lambrou Agro

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



Δίκτυο καταστημάτων	4
Μορφές του προϊόντος και προδιαγραφές	5
Ορολογία ανθεκτικότητας και κωδικοί	7

ΚΡΑΜΒΟΕΙΔΗ

Λευκό Λάχανο (Κραμπι)	10-11
Κόκκινο Λάχανο (Κραμπι)	12
Λάχανο Savoy	13
Λαχανάκια Βρυξελλών	13
Κουνουπίδι	14-15
Μπρόκολο	16
Κινέζικο Λάχανο	17
Λαχανίδα (Kale)	18
Κουλούμπρα	18

ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΑΜΙΕΡΓΕΙΕΣ

Καρότο	20-22
Παντζάρι	24

ΚΡΕΜΜΥΔΙ

Κρεμμύδι	26-29
Κρεμμυδάκι δέσμης	30
Πράσο (τύπου Bulgarian)	30

ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Μαρουλια	33-39
Ραντίτσιο (Radicchio)	40
Αντίδι κατασάρο (frisée)	40
Σπανάκι	40
Φινόκιο	41
Πράσινο σπαράγγι	41
Αναρριχωμένο φασολάκι πλατύ	41
Σέλινο	42

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Πιπεριά	44
Κολοκυθάκι	45
Τομάτα	45

Δηλώσεις αποποίησης	47
---------------------------	----

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ:

Κεντρικά Γραφεία-Αποθήκες:

Οθέλλου 11, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου,
2540 Δάλι, Λευκωσία, Κύπρος
Τ: +357 22667908
Ε: info@lambrouagro.com.cy
W: www.lambrouagro.com.cy

Προδρόμου:

Προδρόμου 107,
2064, Έγκωμη
Τ: 22660171

Λατσιά:

Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 223,
2235, Λατσιά
Τ: 22496858

Περιστερώνα:

Μόρφου 11,
2731, Περιστερώνα
Τ: 22312992

Λεμεσός:

Λεωφόρος Πάφου 186,
4152, Κάτω Πολεμίδια
Τ: 25391048

Παρεκκλησιά:

Ελευθερίας 2,
4520, Παρεκκλησιά
Τ: 25635373

Δάλι:

Οθέλλου 11, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου,
2540, Δάλι
Τ: 22667908

Λάρνακα:

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 51,
6036, Λάρνακα
Τ: 24635933

Κίτι:

Δημοσθένους 8, Βιοτεχνική Περιοχή Κιτίου,
7550, Κίτι
Τ: 24654552

Πάφος:

Λεωφόρος Μεσόγης 25,
8280, Μεσόγη
Τ: 26220758

Ξυλοφάγου:

Ανασάση Μανώλη 38,
7520, Ξυλοφάγου
Τ: 24726616

Σωτήρα:

Σταδίου 49,
5390, Σωτήρα
Τ: 23730660



ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η καλλιέργεια λαχανικών έχει γίνει μια άκρως εξειδικευμένη και εντατική δραστηριότητα. Ως αποτέλεσμα της συνεχούς αυξανόμενης ζήτησης για καλύτερη ποιότητα, οι καλλιεργητές κηπευτικών και παραγωγοί φυτών απαιτούν μια βελτιωμένη ποιότητα του βασικού υλικού. Η ζήτηση για ειδικές μορφές σπόρων και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των σπόρων έχει αυξηθεί με στόχο την καλύτερη φυτρωτικότητα και την αύξηση του αριθμού των παραγόμενων φυτών.

Οι σπόροι είναι ένα φυσικό προϊόν. Οι συχνά μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν όμως το τελικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, συχνά δεν είναι δυνατόν να δοθούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση και άλλων φυσικών χαρακτηριστικών των σπόρων. Για να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες των πελατών όσο το δυνατόν περισσότερο, η Bejo έχει δημιουργήσει πρότυπα ποιότητας για τις διάφορες κατηγορίες των σπόρων.

Οι προδιαγραφές του προϊόντος δεν σημαίνει ότι έχουν ως απόλυτο στόχο τα ελάχιστα πρότυπα για την παράδοση. Εάν οι ποιοτικοί έλεγχοι της Bejo εμφανίζουν χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι προσδιορίζονται από τις προδιαγραφές του προϊόντος, η Bejo θα ενημερώσει τους μελλοντικούς αγοραστές του σπόρου. Η ενημέρωση αυτή στοχεύει στο να πληροφορεί τους επαγγελματίες χρήστες των σπόρων για την ποιότητα του σπόρου που αναμένουν, ώστε να εκτιμούν και να αποφασίζουν αν αυτοί οι σπόροι ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Οι προδιαγραφές του προϊόντος, τόσο για τη φυτρωτικότητα όσο και την καθαρότητα της ποικιλίας των precision σπόρων και οι απαιτήσεις για την υγεία των σπόρων βασίζονται σε πρότυπα που προτείνονται από τον Euroseeds.

ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλοι οι σπόροι πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν τον τυποποιημένο σπόρο σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου της ΕΕ 2002/55/ΕΚ.

Κανονικός "Normal" σπόρος

Σε γενικές γραμμές, ο κανονικός σπόρος δεν έχει υποβληθεί σε ειδικές διεργασίες. Πωλείται κατά βάρος και / ή με τον αριθμό σπόρων, ανάλογα με το προϊόν.

Bejo Precision

Ο Bejo Precision είναι σπόρος ακριβείας. Για τον Bejo precision χρησιμοποιούνται οι πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας. Ο σπόρος έχει ομοιόμορφο μέγεθος και υψηλή φυτρωτικότητα. Τα χαρακτηριστικά του Bejo Precision καθορίζονται από τις προδιαγραφές του Euroseeds.

Προβλασπημένος "Primed" σπόρος

Προβλάστηση ορίζεται η ενεργοποίηση της διαδικασίας φυτρώματος του σπόρου με σκοπό την ταχύτερη και πιο ομοιόμορφη εμφάνιση μετά τη σπορά. Αυτή η διαδικασία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια πιο ομοιόμορφη καλλιέργεια και βοηθάει στην πιο ακριβή αντιμετώπιση των ζιζανίων.

Κουφετοποιημένος "Pelleted" σπόρος

Ως κουφετοποίηση ορίζεται η διαδικασία αλλαγής της μορφής του σπόρου καλύπτοντας τον με ένα υλικό, με κύριο σκοπό τη βελτίωση της ομοιομορφίας του μεγέθους και σχήματος με αποτέλεσμα τη βελτιωμένη ικανότητα σποράς. Επίσης, είναι δυνατό να προστεθούν επωφελή συστατικά. Για κουφετοποίηση χρησιμοποιείται σπόρος Bejo Precision.

Bejo Βασική επικάλυψη (πράσινο χρώμα)

Η βασική επικάλυψη της Bejo γίνεται μέσω ενός λεπτού φιλμ μυκητοκτόνου. Το μυκητοκτόνο αυτό παρέχει προστασία από εδαφογενείς μύκητες, από την βλάστηση μέχρι τα πρώτα στάδια του φυτού.

Συμβουλές ασφαλούς χειρισμού επικαλυμμένων σπόρων

Όταν χρησιμοποιούνται σπόροι επικαλυμμένοι με μυκητοκτόνα ή/και εντομοκτόνα, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης τόσο για τον χρήστη όσο και για το περιβάλλον. Ανατρέξτε στο άρθρο "Treated Seed Safe Use Advice ESTA" στην ιστοσελίδα www.bejo.com.

ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ)

Βιολογικός σπόρος
Ο Βιολογικός σπόρος της Bejo είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 834/2007. Μετά τη συγκομιδή, οι βιολογικά παραγόμενοι σπόροι υποβάλλονται σε φυσική επεξεργασία (π.χ. με χρήση κενού ατμού ή ζεστού νερού). Εφαρμόζουμε οργανική επικάλυψη σε όλους τους βιολογικούς σπόρους μας.

Επικάλυψη Bejo για βιολογικούς σπόρους (κίτρινο χρώμα)
Ο βιολογικός σπόρος της Bejo έχει κίτρινο χρώμα για τη διευκόλυνση της σποράς. Αυτό βοηθά στην καλύτερη ορατότητα ως προς τον έλεγχο του βάθους και της πυκνότητας σποράς. Η οργανική επικάλυψη της Bejo εγκρίνεται από τις αρχές βιολογικής γεωργίας.

Επικάλυψη Bejo για μη χημικώς επεξεργασμένους σπόρους (NCT) (λευκό χρώμα)
Μετά τη συγκομιδή, οι συμβατικά παραγόμενοι σπόροι μπορούν να υποστούν φυσική επεξεργασία (π.χ. με χρήση κενού ατμού ή ζεστού νερού). Ο σπόρος NCT έχει επικάλυψη λευκού χρώματος, χωρίς χημικά πρόσθετα, για τη διευκόλυνση της σποράς και για καλύτερη ορατότητα ως προς τον έλεγχο του βάθους και της πυκνότητας σποράς.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΕΙ EUROSEEDS ΤΩΝ
PRECISION ΚΑΙ ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΩΝ (ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ
ΤΑ ΚΡΑΤΗ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ)

Φυτρωτικότητα
Τα ποσοστά φυτρωτικότητας που αναφέρονται είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα της Bejo και προσδιορίζονται βάσει των μεθόδων ISTA και ανεκτικότητας, και ισχύουν κατά το χρόνο της αποστολής.

Καλλιέργεια		Precision σπόρος	Κουφετο-ποιημένος
ΣΠΑΡΑΓΓΙ	Φυτρωτικότητα	85%	
ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ	Φυτρωτικότητα	90%	
ΠΑΝΤΖΑΡΙ ΜΟΝΟΣΠΕΡΜΟ ΠΟΛΥΣΠΕΡΜΟ	Μέγεθος σπόρου	0,25mm	
	Φυτρωτικότητα	80%	
ΦΡΕΣΚΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ	Μέγεθος σπόρου	90%	
	Μέγεθος σπόρου	0,50 mm	
ΚΑΡΟΤΟ	Φυτρωτικότητα	90%	
	Μέγεθος σπόρου	0,25 mm	
ΣΕΛΙΝΟ / ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ	Φυτρωτικότητα	85%	
ΣΕΛΙΝΟ / ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ	Φυτρωτικότητα	0,20 mm	90%
ΚΟΛΟΚΥΘΙ	Φυτρωτικότητα	90%	
ΜΑΡΟΥΛΙΑ	Φυτρωτικότητα	92%	
	Butterhead, Batavia, Iceberg		
ΜΑΡΟΥΛΙΑ	άλλους τύπους	93%	95%
	Φυτρωτικότητ	93%	95%
ΑΝΤΙΔΙ	Φυτρωτικότητα	90%	92%
ΦΙΝΟΚΙΟ	Φυτρωτικότητα	90%	90%
ΦΙΝΟΚΙΟ	Μέγεθος σπόρου	0,20/0,50 mm	
	Μέγεθος σπόρου	90%	90%
ΠΡΑΣΟ OP F1	Φυτρωτικότητα	85%	85%
ΠΡΑΣΟ OP F1	Μέγεθος σπόρου	0,20/0,25 mm	
	Μέγεθος σπόρου	90%	
ΚΡΕΜΜΥΔΙ	Φυτρωτικότητα	0,75 mm	
ΡΑΝΤΙΤΣΙΟ / ΡΑΔΙΚΙ	Φυτρωτικότητα	88%	88%
ΣΠΑΝΑΚΙ	Φυτρωτικότητα	85%	
ΣΠΑΝΑΚΙ	Μέγεθος σπόρου	0,75 mm	
ΓΛΥΚΙΑ / ΚΑΥΤΕΡΗ ΠΙΠΕΡΙΑ	Φυτρωτικότητα	90%	
ΤΟΜΑΤΑ	Φυτρωτικότητα	92%	

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EUROSEEDS ΓΙΑ
ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ* ΤΩΝ PRECISION
ΣΠΟΡΩΝ (Ισχύουν για κράτη - μέλη της ΕΕ)

Καλλιέργεια		Ελάχιστη καθαρότητα ποικιλίας % για τους precision σπόρους
ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ ΚΟΛΟΚΥΘΙ		93
		97
ΜΑΡΟΥΛΙΑ	Butterhead, Batavia, Iceberg	98
	άλλους τύπους	95
ΠΙΠΕΡΙΑ		97
ΤΟΜΑΤΑ	νωπή	98
	βιομηχανική	95

*Η καθαρότητα ποικιλίας ορίζεται ως εξής: το ποσοστό των φυτών από μια παρτίδα σπόρων που πληρεί τις προδιαγραφές της ποικιλίας.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΠΟΡΩΝ

Προκειμένου να προμηθεύσει επαρκώς υγιείς σπόρους λαχανικών και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ΕΕ οδηγίας 2002/55/EC του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Bejo χρησιμοποιεί διάφορες στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων για την πρόληψη, τον έλεγχο και τη μετάδοση των ασθενειών. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, προγράμματα δοκιμών ασθενειών, προστασία στην παραγωγή των σπόρων, επιτόπιες επιθεωρήσεις, καθώς και χρήση μεθόδων απολύμανσης των σπόρων.

Η ISHI-Veg έχει δημιουργήσει το εγχειρίδιο μεθόδων δοκιμών για την φυτοϋγεία των σπόρων, το οποίο περιλαμβάνει την τεχνική και τα πρωτόκολλα δοκιμών φυτοϋγείας σπόρων. Η Bejo ακολουθεί τα προτεινόμενα ελάχιστα μεγέθη της Ishi-Veg από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα για τον έλεγχο της υγείας των σπόρων. Πληροφορίες σχετικά με τα ISHI-Veg πρωτόκολλα φυτοϋγείας σπόρων και τα προτεινόμενα ελάχιστα μεγέθη δείγματος μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση:

<https://www.worldseed.org/resources/ishi-veg-protocols/>

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Επεξήγηση των όρων που περιγράφουν την αντίδραση των φυτών στα παράσιτα¹

Στις πληροφορίες που παρέχονται από τον Πωλητή, δίνεται η ακόλουθη ερμηνεία στους παρακάτω όρους:

- 'Ευαισθησία': η αδυναμία μιας φυτικής ποικιλίας να περιορίσει την ανάπτυξη ή / και την εξέλιξη ενός συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού.
- 'Ανθεκτικότητα': η ικανότητα μιας φυτικής ποικιλίας να περιορίζει την ανάπτυξη ή/και την εξέλιξη ενός συγκεκριμένου παρασίτου ή/και τη ζημιά που προκαλεί σε σύγκριση με ευπαθείς φυτικές ποικιλίες υπό παρόμοιες συνθήκες.
- Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν κάποια συμπτώματα ασθένειας ή ζημιές κάτω από μεγάλη πίεση από παράσιτα ή κλιματολογικές συνθήκες.

Ορίζονται δύο επίπεδα ανθεκτικότητας:

- Υψηλή ανθεκτικότητα (HR): φυτικές ποικιλίες που περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη ή / και την εξέλιξη του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού και / ή τη προσβολή που προκαλείται υπό κανονική πίεση επιβλαβών οργανισμών σε σύγκριση με τις ευαίσθητες ποικιλίες.
- Ανεκτικότητα (IR): φυτικές ποικιλίες που περιορίζουν την ανάπτυξη ή / και την εξέλιξη του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού και / ή τη προσβολή που προκαλείται, αλλά μπορεί να εμφανίζουν μεγαλύτερο εύρος συμπτωμάτων ή προσβολών σε σύγκριση με τις ποικιλίες υψηλής ανθεκτικότητας.

Ποικιλίες που ισχυρίζονται ότι έχουν το ίδιο επίπεδο ανθεκτικότητας έναντι ενός συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού, ενδέχεται να εμφανίζουν διαφορετική εκδήλωση ανθεκτικότητας λόγω διαφορετικού γενετικού

υπόβαθρου μιας ποικιλίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι εάν απαιτείται ανθεκτικότητα σε μια ποικιλία φυτών, αυτή περιορίζεται στους συγκεκριμένους βιοτύπους, παθοτύπους, φυλές ή τα στελέχη του παρασίτου.

Εάν στην απαίτηση για ανθεκτική ποικιλία δεν προσδιορίζονται οι βιότυποι, παθότυποι, φυλές ή τα στελέχη, ενός συγκεκριμένου παρασίτου, αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει αποδεκτή γενική ή σχετική ταξινόμηση των βιοτύπων, παθοτύπων, φυλών ή στελεχών του συγκεκριμένου παρασίτου. Οι νέοι βιότυποι, παθότυποι, φυλές ή τα στελέχη που ενδέχεται να προκύψουν δεν καλύπτονται από την ήδη υπάρχουσα λίστα ανθεκτικότητας.

- «Ανοσία»: ποικιλία φυτού η οποία δεν προσβάλλεται ή μολύνεται από ένα συγκεκριμένο παράσιτο.

¹ FAO ορίζει ως παράσιτο: κάθε είδος, στέλεχος ή βιότυπο φυτού, ζωικού ή παθογόνου παράγοντα επιβλαβούς για φυτά ή φυτικά προϊόντα. Τα παθογόνα (μικροοργανισμοί όπως βακτήρια, ιοί και μύκητες που προκαλούν μια ασθένεια), περιλαμβάνονται στον όρο «παράσιτο».

Κωδικοί Ανθεκτικότητας

Οι ανθεκτικοί κωδικοί στις ποικιλίες μας κωδικοποιούνται με έναν κωδικό ανθεκτικότητας για συγκεκριμένη καλλιέργεια (ανατρέξτε στη λίστα κωδικοποίησης σε αυτήν τη σελίδα για τις εξηγήσεις), εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Σε περιπτώσεις όπου μια ποικιλία είναι ανθεκτική σε περισσότερα από ένα παράσιτα, οι μεμονωμένοι κωδικοί ανθεκτικότητας διαχωρίζονται με (;).

Για πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις ανθεκτικότητες και την ερμηνεία των κωδικών ανθεκτικότητας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.bejo.com.

		Κωδικός	Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία
ΣΠΑΡΑΓΓΙ	Μύκητες	Pa	<i>Puccinia asparagi</i>	Σκαρίαση
		Bc	<i>Botrytis cinerea</i>	Βοτρίτης
		Sv	<i>Stemphylium vesicarium</i>	Στεμφύλιο
		Xcc	<i>Xanthomonas campestris pv. campestris</i>	Ξανθομονάδα
ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ	Βακτήριο	Ac	<i>Albugo candida</i>	Λευκή σκουριά
		Foc	<i>Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans</i>	Φουζάριο
		Hb	<i>Hyaloperonospora brassicae</i>	Περωνόσπορος
		Pyb	<i>Pyrenopeziza brassicae</i>	Πυρνοπεζιτα
		Mb	<i>Mycosphaerella brassicicola</i>	Ring spot
		Ss	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Σκληρωτίνια
	Μύκητες	Pb	<i>Plasmadiophora brassicae</i>	Πλασμοδιοφόρα
		Vd	<i>Verticillium dahliae</i>	Βερτιτσίλιο
		VI	<i>Verticillium longisporum</i>	Βερτιτσίλιο
	Έντομο	Tt	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας
		Ad	<i>Alternaria dauci</i>	Αλτερνάρια
		Ar	<i>Alternaria radicina</i>	Αλτερνάρια
ΚΑΡΟΤΟ	Μύκητες	Cc	<i>Cercospora carotae</i>	Κερκόσπορα
		Eh	<i>Erysiphe heraclei</i>	Όϊδιο
		Ma	<i>Mycocentrospora acerina</i>	Liquorice rot
		Ps	<i>Pythium sulcatum</i>	Πύθιο
		Pv	<i>Pythium violae</i>	Πύθιο
		Rc	<i>Rhizoctonia carotae</i>	Black spot
	Ιοί	CtRLV	Carrot red leaf virus	Carrot red leaf
		CMoV	Carrot mottle virus	Carrot mottle

		Κωδικός	Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία
ΣΕΛΙΝΟ	Μύκητες	Foa	<i>Fusarium oxysporum f. sp. apii</i>	Φουζάριο
		Sa	<i>Septoria apiicola</i>	Σεπτόρια
	Ιός	CeMV	Celery mosaic virus	Celery mosaic
ΡΑΝΤΙΤΣΙΟ, ΡΑΔΙΚΙ / ΑΝΤΙΔΙ	Ιός	TSWV	Tomato spotted wilt virus	Κηλιδωτός Μαρασμός Τομάτας
ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΟ ΦΑΣΟΛΙ	Ιοί	BCMVN	Bean common mosaic necrosis virus	Bean common mosaic necrosis
		SBMV	Southern bean mosaic virus	Southern bean mosaic
		BCMV	Bean common mosaic virus	Μωσαϊκό Φασολιού
	Μύκητας	Er	<i>Erysiphe polygoni</i>	Όidium
ΚΟΛΟΚΥΘΙ	Ιοί	CMV	Cucumber mosaic virus	Μωσαϊκό Αγγουριού
		PRSV	Papaya ringspot virus	Papaya ringspot
		WMV	Watermelon mosaic virus	Μωσαϊκό Καρπουσιού
		ZYMV	Zucchini yellow mosaic virus	Zucchini yellows
	Μύκητες	Ap	<i>Alternaria porri</i>	Αλτερνάρια
		Foc	<i>Fusarium oxysporum f. sp. cepae</i>	Φουζάριο
		Pd	<i>Peronospora destructor</i>	Περονόσπορος
Pp		<i>Phytophthora porri</i>	Φυτόφθορα	
Pa		<i>Puccinia allii</i>	Σκωρίαση	
Pt	<i>Pyrenochaeta terrestris</i>	Πυρνοχαίτα		
ΣΑΛΑΤΑ	Έντομο	Tt	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας
	Μύκητες	Bl	<i>Bremia lactucae</i>	Περονόσπορος
		Fol	<i>Fusarium oxysporum f. sp. lactucae</i>	Φουζάριο
	Ιοί	LMV	Lettuce mosaic virus	Μωσαϊκό Μαρουλιού
		TBSV	Tomato bushy stunt virus	Lettuce die-back
ΚΑΥΤΕΡΗ & ΓΛΥΚΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑ	Έντομο	Nr	<i>Nasonovia ribisnigri</i>	Αφίδα
	Βακτήριο	Xcv	<i>Xanthomonas campestris pv. vesicatoria</i>	Ξανθομονάδα
	Μύκητας	Pc	<i>Phytophthora capsici</i>	Φυτόφθορα
		CMV	Cucumber mosaic virus	Μωσαϊκό Αγγουριού
		PVY	Potato Y virus	Potato Y
		BPMoV*	Bell pepper mottle virus	Bell pepper mottle
		PaMMV*	Pepper mild mottle virus	Paprika mild mottle
		PMMoV *	Pepper mild mottle virus	Pepper mild mottle
		TMGMV*	Tobacco mild green mosaic virus	Tobacco mild green mosaic
		TMV*	Tobacco mosaic virus	Μωσαϊκό Καπνού
		ToMV*	Tomato mosaic virus	Μωσαϊκό Τομάτας
Κωδικός ομάδας ιών	Tm	Tobamov: * Ιοί με σήμανση	Η ποικιλία είναι ανθεκτική στους συγκεκριμένους Tm κωδικούς	
ΠΑΝΤΖΑΡΙ	Ιός	BNYV	Beet necrotic yellow vein virus	Ριζομανία
ΣΠΑΝΑΚΙ	Ιός	CMV	Cucumber mosaic virus	Cucumber mosaic
	Μύκητες	Cv	<i>Cladosporium variabile</i>	Κλαδοσπόριο
		Pfs	<i>Peronospora farinosa f. sp. spinaciae</i>	Περονόσπορος
ΤΟΜΑΤΑ	Οοί	Pst	<i>Pseudomonas syringae pv. tomato</i>	Ψευδομονάδα
		TLCV	Tomato leaf curl virus	Tomato leaf curl
		TMV	Tobacco mosaic virus	Μωσαϊκό Καπνού
		ToMV	Tomato mosaic virus	Μωσαϊκό Τομάτας
		TSWV	Tomato spotted wilt virus	Κηλιδωτός Μαρασμός Τομάτας
		TYLCV	Tomato yellow leaf curl virus	Tomato yellow leaf curl
		Pf	<i>Passalora fulva</i>	Leaf mold
	Μύκητες	Fol	<i>Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici</i>	Φουζάριο
		For	<i>Fusarium oxysporum f. sp. radicle-lycopersici</i>	Φουζάριο
		Pi	<i>Phytophthora infestans</i>	Φυτόφθορα
		Ss	<i>Stemphylium solani</i>	Στεμφύλιο
		Va	<i>Verticillium albo-atrum and/or Verticillium dahlia</i>	Βερτιτσιλλιο
		Cv	<i>Cladosporium variabile</i>	Κλαδοσπόριο
		Ma	<i>Meloidogyne arenaria</i>	Νηματοδής
	Νηματοδείς	Mi	<i>Meloidogyne incognita</i>	Νηματοδής
Mj		<i>Meloidogyne javanica</i>	Νηματοδής	



Η εξερεύνηση της φύσης
δεν σταματάει ποτέ

ΚΡΑΜΒΟΕΙΔΗ



ΛΕΥΚΟ ΛΑΧΑΝΟ (ΚΡΑΜΠΙ)

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.



FARO F1

Πολύ πρώιμο υβρίδιο με καλή κάλυψη κεφαλής. Λαμπερό πράσινο χρώμα, πολύ μαλακό με ωραία γεύση.

- Καλλιεργητική περίοδος: 65 ημερών
- Εποχή σποράς: Φθινόπωρο και Άνοιξη σε ημιορεινές περιοχές
- Βάρος σε κιλά: 1,5-2



BAJONET F1

Πρώιμο υβρίδιο. Πολύ καλή ποικιλία με ωραία πράσινη, στρογγυλή και συμπαγή κεφαλή. Μεγάλη διατηρησιμότητα και ωραία γεύση.

- Καλλιεργητική περίοδος: 75-80 ημερών
- Εποχή σποράς: 01.09-30.03
- Βάρος σε κιλά: 1,5-2,2
- Πυκνότητα φυτών (cm): 40-50 x 40
- HR: Foc



Η εξερεύνηση της φύσης
δεν σταματάει ποτέ

THOMAS F1

Πρώιμο υβρίδιο για παραγωγή ποιοτικού καρπού σχεδόν ολόχρονα αλλά με καταλληλότερη περίοδο Μάρτιο με Οκτώβριο.

- Καλλιεργητική περίοδος: 80-85 ημερών
- Εποχή σποράς: Ολόχρονα με καταλληλότερη περίοδο από τον Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο
- Βάρος σε κιλά: 1,5-1,8
- HR: Foc

▸ bejo.com



ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΧΑΝΟ (ΚΡΑΜΠΙ)

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.

ΛΑΧΑΝΟ SAVOY

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.

ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.



OMERO F1

Ξεχωρίζει για την ομοιόμορφη κεφαλή του. Έχει εξαιρετικό κόκκινο χρώμα τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Συνήθως δίνει πιο μεγάλη κεφαλή από το Primo. Μεγαλύτερη ανοχή στις υψηλές θερμοκρασίες.

- Καλλιεργητική περίοδος: 75 ημερών
- Εποχή σποράς: Ολόχρονα
- Βάρος σε κιλά: 1 - 2
- Πυκνότητα φυτών (cm): 50 x 50



RANCHERO F1

Μεσοπρώιμη ποικιλία με στρογγυλή κεφαλή συνεκτική, χαμηλή, με εξαιρετικό κόκκινο χρώμα εσωτερικά και εξωτερικά. Φυτεύεται ολόχρονα με καλές αποδόσεις.

- Καλλιεργητική περίοδος: 85-90 ημερών
- Εποχή σποράς: Ολόχρονα
- Βάρος σε κιλά: 1,5 - 1,8
- Πυκνότητα φυτών (cm): 50 x 50
- HR: Foc



FAMOSA F1

Μεσοπρώιμο υβρίδιο Savoy με σκούρο πράσινο χρώμα. Πολύ γρήγορη ανάπτυξη με στρογγυλή και συνεκτική κεφαλή.

- Καλλιεργητική περίοδος: 65 ημερών
- Εποχή σποράς: Άνοιξη και Φθινόπωρο
- Βάρος σε κιλά: 1,5 - 2
- Πυκνότητα φυτών (cm): 45 x 40
- Παρατηρήσεις: Σκούρο Πράσινο
- IR: Ac



MARTE F1

Δυνατό φυτό με καλό ύψος που παράγει στρογγυλούς, σκουροπράσινους καρπούς εξαιρετικής γεύσης και ποιότητας. Υψηλή παραγωγή και ομοιομορφία στο μέγεθος του καρπού.

- Καλλιεργητική περίοδος: 130 ημερών
- Εποχή σποράς: Φθινόπωρο
- HR: Foc



Η εξερεύνηση της φύσης
δεν σταματάει ποτέ

ALCALA F1 ► NEO

Το νέο καλοκαιρινό κουνουπίδι της Bejo. Φυτεύεται από νωρίς την άνοιξη, το καλοκαίρι στα ορεινά και νωρίς το φθινόπωρο στα πεδινά. Είναι πρώιμο κουνουπίδι. Έχει πολύ δυνατό και ψηλό φυτό που προστατεύει την κεφαλή από την ηλιακή ακτινοβολία. Παράγει κεφαλή έντονου λευκού χρώματος.

- Καλλιεργητική περίοδος: 65-75 ημερών
- Εποχή σποράς (ορεινά): 01.03.-30.10.
- Εποχή σποράς (πεδινά): 01.02-15.05 & 20.08-30.09.
- Βάρος σε κιλά: 1,5-2,0 kg

► bejo.com

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.



FARGO F1

Εξαιρετικό υβρίδιο για πρώιμη παραγωγή σε διάφορες περιοχές. Συνδυάζει δυνατό φυτό, με άριστη κάλυψη κεφαλής, καλό μέγεθος και κατάσπρο χρώμα. Φυτεύεται σχεδόν ολόχρονα εκτός των θερμών περιόδων.

- Καλλιεργητική περίοδος: 85-90 ημερών
- Εποχή σποράς: 01.08-30.10
- Βάρος σε κιλά: 1,7-1,9 Kg



SKYWALKER F1

Υβρίδιο με εξαιρετική εμφάνιση, κάλυψη και μέγεθος. Χαρακτηριστικά παρόμοια με του FARGO αλλά 5 – 10 μέρες πιο όψιμο. Παράγει άριστης ποιότητας άσπρη στρογγυλή κεφαλή με φυλλική κάλυψη που το προστατεύει από το κιτρίνισμα.

- Καλλιεργητική περίοδος: 90-95 ημερών
- Εποχή σποράς: 01.09-15.03
- Βάρος σε κιλά: 1,6-2 Kg



► NEO

ADONA F1

Κουνουπίδι με σταθερή παραγωγή, συνεκτική κεφαλή και πολύ καλή γεύση. Έχει πολύ καλή κάλυψη κεφαλής που διατηρεί το έντονο λευκό του χρώμα.

- Καλλιεργητική περίοδος: 75-80 ημερών
- Εποχή σποράς: 01.09-15.03
- Βάρος σε κιλά: 1,5 – 2 Kg



► NEO

VERONICA F1

Μεσοπρώιμο υβρίδιο που παράγει πολύ ωραία τριγωνική κεφαλή με εντυπωσιακό φρέσκο πράσινο χρώμα. Πολύ ανθεκτικό στο χωράφι, διατηρεί την ποιότητα και το χρώμα κεφαλής για αρκετό χρονικό διάστημα.

- Καλλιεργητική περίοδος: 90-95 ημερών
- Εποχή σποράς: 01.03. - 15.05
- Βάρος σε κιλά: 1,8-2 Kg
- HR: Foc



ΜΠΡΟΚΟΛΟ

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.



FIESTA F1

Ωραία πράσινη συνεκτική κεφαλή. Για συγκομιδή μέχρι το καλοκαίρι.

- Καλλιεργητική περίοδος: 90-95 ημερών
- Πλευρικούς βλαστούς: Ναι
- Εποχή σποράς: 01.02-30.04.
- Βάρος σε κιλά: 0,5-0,7 Kg
- HR: Foc
- IR: Ac; Xcc



COVINA F1

Μεσοπρώιμη ποικιλία. Υψηλή παραγωγή, με εξαιρετικό σχήμα κεφαλής και μαλακά ανθίδια. Ιδανικό για ξεχειμώνισμα.

- Πλευρικούς βλαστούς: Ναι
- Εποχή σποράς: 01.09-31.12.
- Βάρος σε κιλά: 0,6-0,8 Kg
- HR: Foc
- IR: Ac



ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.



MANOKO F1

Πολύ πρώιμο υβρίδιο για γρήγορη παραγωγή. Κοντή συνεκτική κεφαλή ανοικτού πράσινου χρώματος. Μεγάλη αντοχή στο άβλωμα και στο φουζάριο.

- Εποχή σποράς: Φθινόπωρο και Χειμώνας
- Βάρος σε κιλά: 0,8-1,2
- HR: Foc



ΕΜΙΚΟ F1

Πρώιμο υβρίδιο, συμπαγής, ελαφρώς πεπλατυσμένη κεφαλή. Για καλλιέργεια το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Σχετικά ανθεκτικό στις ψηλές θερμοκρασίες.

- Εποχή σποράς: Άνοιξη και Φθινόπωρο
- Βάρος σε κιλά: 1-1,7
- HR: Foc; Pb:0,1,3





ΛΑΧΑΝΙΔΑ (KALE)

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L.



SUNBOR F1

Ποικιλία κόκκινου Kale με έντονο χρώμα φύλλων. Καλλιεργείται και σαν λαχανικό αλλά και σαν καλλωπιστικό φυτό. Το χρώμα του φύλλου του είναι τόσο ξεχωριστό που κάνει πολύ ωραία αντίθεση με τις παραδοσιακές πράσινες ποικιλίες.



OLDENBOR F1

Η νέα ποικιλία πράσινου Kale της Bejo με μεγαλύτερα φύλλα αλλά και μεγαλύτερη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες. Ελκυστικά πράσινα φύλλα υψηλής διατροφικής αξίας. Μεγάλο παράθυρο συγκομιδής.

- ▶ HR: Foc
- ▶ IR: Xcc

ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΑ

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes



KOSSAK F1

Το μοναδικό υβρίδιο κουλούμπρας που συνδυάζει πρωιμότητα μέγεθος και ποιότητα. Μεγάλο φύλλωμα, δυνατή ρίζα, κατάλληλο για όλες τις εποχές. Έχει τραγανή σάρκα, με ωραίο άρωμα και πολύ ωραία γεύση. Παραμένει στο χωράφι για αρκετό χρονικό διάστημα χωρίς να αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά της.



Η εξερεύνηση της φύσης
δεν σταματάει ποτέ

ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

▶ bejo.com



ΚΑΡΟΤΟ

Daucus carota L.



NIAGARA F1

Πολύ πρόωμη ποικιλία. Παράγει μακριά κυλινδρική ρίζα με άριστο δέσιμο. Είναι γνωστή για τη λεία επιφάνεια της και την απίθανη εσωτερική και εξωτερική της εμφάνιση. Καλή ανθεκτικότητα σε ξηρικές συνθήκες. Μόλις ωριμάσει πρέπει να συγκομίζεται.

- Καλλιεργητική περίοδος: 100-105 ημερών
- IR: Ad; Ar; Cc



NATUNA F1

Εξαιρετικό σχήμα, χωρίς στίγματα, δεν σπάει μετά το πλύσιμο. Όταν φυτευτεί την σωστή εποχή έχει εξαιρετική εμφάνιση. Ανεκτική σε ασθένειες φυλλώματος.

- Καλλιεργητική περίοδος: 115-120 ημερών
- IR: Ad; Ar; Cc; Ps, Pv



► **NEO**

NEBIDA F1

Δυνατό φυτό με μεγάλο φύλλωμα που αποσπάται κατά την συγκομιδή σε συνεκτικά εδάφη. Τα καρότα ξεχωρίζουν γιατί είναι λεία, έχουν έντονο πορτοκαλί χρώμα και μήκος 18-20 cm με ομαλή επιδερμίδα χωρίς πολλές τριχες.

- Καλλιεργητική περίοδος: 115-120 ημερών
- IR: Ad; Ar



NEVIS F1

Παράγει μακριά καρότα με καλό εσωτερικό και εξωτερικό χρώμα. Πλούσιο φύλλωμα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ασθενειών. Από τις ποικιλίες που αντέχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο χωράφι χωρίς να χοντρύνουν.

- Καλλιεργητική περίοδος: 115-120 ημερών
- IR: Ar; Cc

Η εξερεύνηση της φύσης
δεν σταματάει ποτέ

NARITA F1 ► **NEO**

Πρόωμη ποικιλία κατάλληλη για όλες τις συνθήκες. Παράγονται καρότα τύπου Nantes, κυλινδρικά καλού μεγέθους, πολύ ομοιόμορφα και ομαλά. Έχει δυνατό φύλλωμα γεγονός που διευκολύνει την συγκομιδή σε συνεκτικά εδάφη. Προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικές συνθήκες και είναι ιδανική για φρέσκες και βιομηχανικές χρήσεις.

- Καλλιεργητική περίοδος: 115-120 ημερών
- IR: Ad; Ar; Cc; Ps, Pv

► bejo.com



ΚΑΡΟΤΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ

Daucus carota L.



DEEP PURPLE F1

Ελκυστικό μωβ χρώμα, για σχεδόν όλες τις εποχές φύτευσης.

- Καλλιεργητική περίοδος: 115-120 ημερών
- IR: Ps, Pv



PURPLE SUN F1

Καρότο με έντονο μωβ χρώμα. Κατάλληλο για διάφορες εποχές καλλιέργειας.

- Καλλιεργητική περίοδος: 125 ημερών
- IR: Ps, Pv



YELLOWSTONE

Δυνατό φυτό. Καρότο μεγάλο, κίτρινου χρώματος. Υψηλής παραγωγής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για νωπή κατανάλωση όσο και για χυμό.

- Καλλιεργητική περίοδος: 140 ημερών
- IR: Ad; Ar; Cc



Η εξερεύνηση της φύσης
δεν σταματάει ποτέ

Ο precision σπόρος (αριστερά) ξεπεράστηκε σε απόδοση από τον σπόρο B-Mox® (δεξιά)

B-MOX®

ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΟΡΩΝ
ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΓΙΗ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ

Για την παραγωγή μιας υγιούς, ομοιόμορφης καλλιέργειας, είναι σημαντικό τα νεαρά φυτά να ξεκινούν δυνατά. Γι' αυτό αναπτύξαμε την καινοτόμο φόρμουλα βελτίωσης σπόρων B-Mox®. Με βάση τη νέα τεχνολογία, το B-Mox® ενισχύει τη δύναμη του σπόρου, παρέχοντας περισσότερη ενέργεια στα φυτά τονώνοντας την ανάπτυξή τους στο πρώιμο στάδιο.

Οι διεθνείς ερευνητικές δοκιμές μας, έδειξαν ότι η τεχνολογία B-Mox® προσφέρει κατά μέσο όρο 5% βελτίωση στην ανάπτυξη της καλλιέργειας σε σχέση με το τυπικό priming. Πολλοί καλλιεργητές έχουν βιώσει τα πλεονεκτήματα του B-Mox®, με ισχυρότερες, ομοιόμορφες καλλιέργειες και υψηλότερη παραγωγή. Συχνά έχουν δει έως και 15% υψηλότερη παραγωγή σε σύγκριση με τους μη primed σπόρους. Οι πελάτες αναφέρουν επίσης θετική επίδραση στην αποθήκευση των καρότων.

Η τεχνολογία B-Mox® διατίθεται για καρότο και μαϊντανόριζα και προσφέρεται πάντα σε συνδυασμό με την priming τεχνολογία.



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΗ



ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΟ B-MOX® ΣΕ
ΔΡΑΣΗ


Διατίθεται επίσης στο bejo.com και
Bejo YouTube κανάλι.

► bejo.com



ΠΑΝΤΖΑΡΙ

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.



► ΝΕΟ

RHONDA F1

Ομοιόμορφο, στρογγυλό σχήμα, ανεκτικό σε συνθήκες στρες, κατάλληλο για αποθήκευση.


- Καλλιεργητική περίοδος: 65 ημερών
- Εποχή σποράς: 15.09-30.04



RED CLOUD F1

Συνδυασμός παραγωγής, εμφάνισης και ποιότητας. Δυνατό φυτό με μεγάλο φύλλωμα. Πλούσιο ριζικό σύστημα για αντοχή σε ξηρές συνθήκες. Στρογγυλό σχήμα ρίζας με έντονο κόκκινο χρώμα. Μεγάλη αντοχή στο άβλωμα. Φυτεύεται σχεδόν όλες τις εποχές του χρόνου με άριστα αποτελέσματα.

- Καλλιεργητική περίοδος: 75 ημερών
- Εποχή σποράς: 15.09-30.04



Η εξερεύνηση της φύσης
δεν σταματάει ποτέ



ΚΡΕΜΜΥΔΙ

► bejo.com



ΚΡΕΜΜΥΔΙ

Allium cepa L.

► Μικρής ημέρας



BASIC F1

Υβρίδιο κρεμμυδιού καλοκαιρινής φύτευσης για παραγωγή φρέσκου, ημίξηρου και ξηρού κρεμμυδιού. Φημίζεται για την πρωιμότητα του, την άριστη εμφάνιση βολβού και την ομοιομορφία μεγέθους.

► IR: Foc; Pt


► Μικρής ημέρας



RED NICE

Μεσοπρώιμη ποικιλία μικρής ημέρας. Βολβός σφαιρικού σχήματος με βαθύ βυσσινί χρώμα εσωτερικά και εξωτερικά. Ομοιόμορφο μέγεθος και υψηλή παραγωγή.

► IR: Foc



Η εξερεύνηση της φύσης
δεν σταματάει ποτέ



ΜΑΚΑΛΟΥ

Ποικιλία μικρής ημέρας. Σφαιρικοί και καλοσχηματισμένοι βολβοί, υψηλή παραγωγή. Είναι κατά περίπου 1 εβδομάδα πιο πρώιμο από αντίστοιχες ποικιλίες της αγοράς.

► IR: Pt

► bejo.com



ΚΡΕΜΜΥΔΙ

Allium cepa L.

► Μεγάλης ημέρας



► NEO

STINGRAY F1

Καινούργια ποικιλία μεγάλης ημέρας που ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά. Υψηλή παραγωγή ομοιόμορφων στρογγυλών βολβών. Ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες ποικιλίες για το έντονο λαμπερό χρώμα των εξωτερικών φύλλων των βολβών κάνοντας έτσι την ποικιλία αυτή ανάρπαστη στις αγορές.

► IR: Foc; Pt

► Μεγάλης ημέρας



ORLEND F1

Πρώιμη ποικιλία μεγάλης ημέρας με υψηλή παραγωγή. Πολύ καλό στρογγυλό σχήμα. Εξαιρετική κάλυψη βολβού. Ξεχωρίζει για το λαμπερό του μπρούντζινο χρώμα. Πολύ καλή μετασυλλεκτική ικανότητα.

► IR: Foc; Pt

► Μεγάλης ημέρας



VALENCIANA TARDIA - LEONE

Ποικιλία κρεμμυδιού που συνδυάζει: σφαιρικό-ελαφρώς πεπλατυσμένο σχήμα, ικανοποιητικό μέγεθος, ωραίο χρωματισμό, ελκυστική εμφάνιση και μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα.

► IR: Foc; Pt

► Μεγάλης ημέρας



RED RUM F1

Ποικιλία βυσσινιού κρεμμυδιού μεγάλης ημέρας που ξεχωρίζει λόγω μεγέθους και άριστης εσωτερικής – εξωτερικής εμφάνισης. Ικανοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς. Μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα.

► IR: Pt

ΚΡΕΜΜΥΔΙ

Allium cepa L.

Εποχή σποράς												
ΠΟΙΚΙΛΙΑ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΪ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠΤ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ
ΜΙΚΡΗΣ ΗΜΕΡΑΣ												
BASIC F1												
MAKALU												
RED NICE												
ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΜΕΡΑΣ												
STINGRAY F1												
ORLEND F1												
VALENCIANA TARDIA - LEONE												
RED RUM F1												

Εποχή φύτευσης στο χωράφι





ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ ΔΕΣΜΗΣ

Allium fistulosum L.

ΠΡΑΣΟ (ΤΥΠΟΥ BULGARIAN)

Allium porrum L.



PARADE

Εντυπωσιακή ποικιλία για δέσμη. Δυνατό φύλλωμα, σχετικά ανθεκτικό στις ασθένειες με σκούρο πράσινο χρώμα. Αντέχει στο χωράφι χωρίς να δημιουργεί βολβό. Ποικιλία που μπορεί να φυτευτεί ολόχρονα.

- Καλλιεργητική περίοδος: 80 ημερών
- Εποχή σποράς: Ολόχρονα
- IR: Foc; Pt



BULGAARSE REUZEN - LINCOLN

Λεπτό, επίμηκες στέλεχος με μακρύ λευκό μέρος. Κατάλληλο για διαφορετικές περιόδους φύτευσης.

- Καλλιεργητική περίοδος: 75 ημερών
- IR: Ap



ΤΟ CROPALYSER APP

είναι μια πρακτική μηχανή αναζήτησης για τους παραγωγούς για να τους βοηθήσει να αναγνωρίζουν έντομα και ασθένειες.

Το App παρέχει πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την ανάπτυξη της καλλιέργειας!



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
CROPALYSER




ΕΝΤΟΜΑ &
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΝΕΕΣ
ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ



ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΓΛΩΣΣΕΣ &
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΥΘΥΝΩΝ



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΛΗΨΗ

CROPALYSER.COM



Η εξερεύνηση της φύσης
δεν σταματάει ποτέ

ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ



ΜΑΡΟΥΛΙΑ

Lactuca sativa L.

Εποχή φύτευσης												
ΠΟΙΚΙΛΙΑ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΪ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠΤ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ
ΒΑΤΑΒΙΑ												
SEMENTEL												
AGRIBEL												
SONYBEL												
BUTTERHEAD												
MALIS												
ICEBERG												
LECTRICE												
BONNICE												
LEONICE												
OAKLEAF												
PLEASANCE												
OAKLY												
LOLLO												
BIONDONNA												
SPECTATION												

Εποχή φύτευσης στο χωράφι

ΜΑΡΟΥΛΙΑ

Lactuca sativa L.

► Butterhead



MALIS

Εξαιρετικό σχήμα και μέγεθος. Φύλλα με ωραίο πράσινο χρώμα.

- Εποχή σποράς: Άνοιξη και Φθινόπωρο
- Βάρος σε κιλά: 0,4-0,6 Kg
- HR: Bl:16-37EU; Nr:0
- IR: LMV:1

► Batavia



AGRIBEL

Σκούρα πράσινα φύλλα που σχηματίζουν συμπαγείς ροζέτες με στρογγυλή βάση. Προτεινόμενη πυκνότητα φύτευσης 12-16 φυτά/m². Εύκολη συγκομιδή με υψηλή εμπορική αξία.

- Εποχή σποράς: Άνοιξη και Φθινόπωρο
- Βάρος σε κιλά: 0,5-0,6 Kg
- HR: Bl:16-37EU; Nr:0; TBSV
- IR: LMV:1


► NEO



SONYBEL

Μαρούλι Batavia για Ανοιξιάτικη και Φθινοπωρινή παραγωγή. Ανθεκτικότητα στην άνθηση, στο πύθιο και στο tipburn. Συμπαγές φυτό, ομοιόμορφο με γρήγορη ανάπτυξη.

- Εποχή σποράς: Άνοιξη και Φθινόπωρο
- Βάρος σε κιλά: 0,5-0,6 Kg
- HR: Bl:16-37EU; Nr:0; TBSV
- IR: LMV:1



Η εξερεύνηση της φύσης
δεν σταματάει ποτέ

SEMENTEL

Κορυφαία ποικιλία batavia για υπαίθρια καλλιέργεια. Ομοιόμορφη παραγωγή που συνδυάζει εμφάνιση αλλά και μεγάλο βάρος.

- Εποχή σποράς: Άνοιξη μέχρι Φθινόπωρο
- Βάρος σε κιλά: 0,2-0,8 Kg
- HR: Bl:16-37EU; Nr:0; TBSV

► bejo.com



ΜΑΡΟΥΛΙΑ

Lactuca sativa L.

► Iceberg



LECTRICE

Δυνατό φυτό, με υπέροχο χρώμα. Εξαιρετική ποικιλία για φθινοπωρινή/ ανοιξιάτικη καλλιέργεια.

- Εποχή σποράς: Άνοιξη και Φθινόπωρο
- HR: Bl:16-37EU; Nr:0


► Iceberg



LEONICE

Καθαρά καλοκαιρινή ποικιλία για τη Νότια Ευρώπη, με μεγάλο μέγεθος φυτού, με ωραία στρογγυλή κεφαλή που τυλίγεται πλήρως. Ανθεκτική στο ξεβλάστωμα.

- Εποχή σποράς: Καλοκαίρι
- HR: Bl:16-37EU



Η εξερεύνηση της φύσης
δεν σταματάει ποτέ

BONNICE ► NEO

Κατάλληλη για υπαίθρια χειμωνιάτικη καλλιέργεια, με υψηλή παραγωγή και εξαιρετικό σχήμα.

- Εποχή σποράς: Φθινόπωρο μέχρι Χειμώνα
- HR: Bl:16-37EU; TBSV

► bejo.com

ΜΑΡΟΥΛΙΑ

Lactuca sativa L.

► Oakleaf



PLEASANCE

Πράσινη ποικιλία oakleaf, με ελκυστική εμφάνιση και υπέροχη γεύση.

- HR: Bl:16-37EU; Nr:0
- IR: LMV:1

► Oakleaf



OAKLY

Σκούρο κόκκινο χρώμα φύλλων με εξαιρετική γεύση. Σγουρή και συμπαγής ροζέτα. Διατηρεί την όψη της φρεσκάδας που έχει για μεγάλο διάστημα μετά την συγκομιδή.

- Εποχή σποράς: Ολόχρονα
- Βάρος σε κιλά: 0,35-0,55 Kg
- HR: Bl:16-30,32-33EU; Nr:0
- IR: LMV:1

► Lollo



BIONDONNA

Σγουρό μαρούλι τύπου "Lollo" με εξαιρετική εμφάνιση και φύλλα σγουρά πράσινου χρώματος. Κατάλληλο για την αγορά φρέσκων προϊόντων αλλά και για εστιατόρια.

- Εποχή σποράς: Ολόχρονα
- Βάρος σε κιλά: 0,4-0,5 Kg
- HR: Bl:16-37EU; Nr:0
- IR: LMV:1



Η εξερεύνηση της φύσης
δεν σταματάει ποτέ



SPECTATION

"Lollo rossa" με μεγάλη κεφαλή, έντονου κόκκινου χρώματος. Προτιμάται στην αγορά για το λόγο ότι δεν χάνει το έντονο του χρώμα τους καλοκαιρινούς μήνες.

- Εποχή σποράς: Ολόχρονα
- Βάρος σε κιλά: 0,35-0,55 Kg
- HR: Bl:16-28,30-32EU; Nr:0

► bejo.com



PANTITΣIO (RADICCHIO)

Cichorium intybus L.

ΑΝΤΙΔΙ ΚΑΤΣΑΡΟ (FRISÉE)

Cichorium endivia L.

ΦΙΝΟΚΙΟ

Foeniculum vulgare Miller

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΑΡΑΓΓΙ

Asparagus officinalis L.



LEONARDO

Μεγάλο συμπαγές, κόκκινο κεφάλι, με ωραία εσωτερική δομή. Καλή διατηρησιμότητα. Σύντομης διάρκειας αποθήκευση. Άριστος συνδυασμός κόκκινου με άσπρο.

- Εποχή σποράς: Νωρίς το Φθινόπωρο
- Βάρος σε γραμμάρια: 500-700



TRÈS FINE MARAÎCHÈRE - RHODOS

Πρώιμη ποικιλία με λεπτά ηριονωτά φύλλα. Συνεκτικό φυτό με ελαφρύ πράσινο χρώμα φύλλων κατάλληλο για διαφορετικές εποχές καλλιέργειας. Αντοχή στο ξεβλάστωμα.



RONDO F1

Πολύ πρώιμο υβρίδιο (80 ημερών), για καλοκαιρινή παραγωγή. Ζωηρό φυτό με έντονο λευκό χρώμα, σφαιρικό σχήμα.

- Καλλιεργητική περίοδος: 80 ημερών



► ΝΕΟ

BACCHUS F1

Πρώιμο 100% αρσενικό υβρίδιο πράσινου σπαραγγιού, χωρίς ανθοκυανίνες. Δίνει ομοιόμορφους βλαστούς. Υψηλή παραγωγή. Συνιστώμενη πυκνότητα φύτευσης 5-6 φυτά ανά μέτρο.

ΣΠΑΝΑΚΙ

Spinacea oleracea L.



REBOUND F1

Ποικιλία σπανακιού με άριστα χαρακτηριστικά. Λεπτός μίσχος και πλούσιο πράσινο φύλλωμα. Παραμένει στο χωράφι για αρκετό χρονικό διάστημα χωρίς μεταβολή της ποιότητας, δίνοντας την ευκαιρία συγκομιδής σε διάφορα στάδια και μεγέθη. Άριστη ποικιλία τόσο για εξαγωγές όσο και για την τοπική αγορά.

- Εποχή σποράς: Άνοιξη και Φθινόπωρο
- HR: Pe:1-4,15

ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΟ ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΠΛΑΤΥ

Phaseolus vulgaris L.



ESTEFANIA

Ποικιλία αναρριχώμενου φασολιού με πλατύ λοβό. Ξεχωρίζει για την παραγωγή και τον ποιοτικό καρπό της. Ωραίο λαμπερό πράσινο χρώμα καρπού. Γρήγορη είσοδος στην παραγωγή. Ίσιος λοβός με εξαιρετική γεύση. Πολύ καλή μετασυλλεκτική ικανότητα. Κατάλληλη ποικιλία για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια.

- IR: BCMV



ΣΕΛΙΝΟ

Apium graveolens L.



TANGO

Πρώιμη ποικιλία που ξεχωρίζει για την εμφάνιση και ποιότητα της. Δίνει δυνατά φυτά (πιο ψηλό από Rumba) με χοντρούς μίσχους και πράσινο λαμπερό χρωματισμό. Μαλακή, τραγανή γεύση με έντονο άρωμα. Δεν εμφανίζει πλευρικούς βλαστούς. Καλή διατηρησιμότητα, κατάλληλο για δύσκολες περιόδους καλλιέργειας.

- Εποχή σποράς: 20.08-30.03
- IR: Foa:2



RUMBA

Χαμηλό φυτό σκούρου πράσινου χρώματος. Διατηρείται για αρκετό χρονικό διάστημα χωρίς να κιτρινίζει. Χοντρός μίσχος, συνεκτικό, αρκετά βαρύ. Μεγάλη αντοχή στο χωράφι χωρίς να κουφώνει.

- Εποχή σποράς: 20.09-30.03

► ΝΕΟ



MERENGO

Συνεκτική ποικιλία με ψηλούς και χονδρούς βλαστούς ωραίου πράσινου χρώματος. Έχει μεγαλύτερο βάρος και ύψος από RUMBA και TANGO. Η δομή του φυτού ευνοεί την εύκολη συγκομιδή του.

- Εποχή σποράς: 20.09-30.03
- IR: Foa:2



Η εξερεύνηση της φύσης
δεν σταματάει ποτέ

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

► bejo.com

ΠΙΠΕΡΙΑ

Capsicum annuum L.



TURBINE F1

Μεγάλοι καρποί τύπου blocky με χοντρά τοιχώματα, βάρους 140 - 160 g. Έχει ανοικτό κίτρινο χρώμα που όταν αφεθεί να ωριμάσει μετατρέπεται σε σκούρο κίτρινο. Ζωηρό φυτό, ανθεκτικό σε συνθήκες στρες. Ξεχωρίζει για την σταθερή υψηλή παραγωγή. Κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια.

► Βάρος (g): 140-160



STANLEY F1

Υβρίδιο τύπου blocky, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις καλλιεργητικής φροντίδας. Βαθύ πράσινο χρώμα που μετατρέπεται σε κόκκινο κατά την ωρίμανση. Μεγάλο μέγεθος καρπού με χοντρά τοιχώματα. Το γεγονός ότι είναι δυνατό φυτό με πυκνά φύλλα, καθιστούν την ποικιλία αυτή την ιδανικότερη για καλοκαιρινή συγκομιδή ακόμα και υπαίθρια.

► Εποχή σποράς: Άνοιξη
► Μέγεθος καρπού: 10 x 8 cm
► HR: Tm:0



► NEO


RIONILO F1

Νέα ποικιλία κίτρινου πιπεριού τύπου blocky. Μεσαίου μεγέθους φυτό που παράγει αρχικά πράσινους καρπούς που όταν ωριμάσουν αποκτούν ωραίο σκούρο κίτρινο χρώμα (πιο σκούρο από TURBINE). Οι καρποί είναι ομοιόμορφοι, οι περισσότεροι τετράλοβοι με χοντρά τοιχώματα. Κατάλληλο για υπαίθρια αλλά και θερμοκηπιακή καλλιέργεια.

► Βάρος(g): 200-250
► HR: Tm:0-2

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ

Cucurbita pepo L.



► NEO

LUGANO F1

Δυνατό φυτό με ανοικτά φύλλα που διευκολύνουν την συγκομιδή. Οι καρποί είναι κυλινδρικοί, με ωραίο σκούρο πράσινο χρώμα με μεγάλη μετασυλλεκτική ικανότητα. Καλή αντοχή στην στάχτη και ενδιάμεση ανθεκτικότητα στον PRSV και ZYMV.

► IR: PRSV; ZYMV

Το προϊόν αυτό προστατεύεται με την πατέντα WO2007084299.

ΤΟΜΑΤΑ

Solanum lycopersicum L.



► NEO

TONATICO F1

Ντομάτα τύπου cherry στρογγυλή. Παράγει ωραίες ομοιόμορφες ντομάτες βάρους 20-25g. Συνεκτικές με ωραία γεύση, για συγκομιδή είτε μία-μία είτε ως τσαμπί. Μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα.

► HR: Fol:0; For; Mi; Pst; ToMV

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παροχή πληροφοριών

Οι ενημερώσεις που παρέχονται για τα προϊόντα της εταιρείας ΒΕJΟ σε οποιαδήποτε μορφή δεν είναι δεσμευτικές. Οι περιγραφές, προτάσεις και εικόνες σε διαφημιστικά φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα και ιστοσελίδες βασίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις εμπειρίες που προέρχονται από τις δοκιμές στην πράξη. Η εταιρεία L. Lambrou Agro σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ευθύνη ωστόσο, οι πληροφορίες τις οποίες παρέχει βασίζονται στα διάφορα αποτελέσματα που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας ενός προϊόντος. Ο αγοραστής πρέπει να καθορίσει αν τα προϊόντα είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη καλλιέργεια και/ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες.

Για πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που αφορά τις ανθεκτικότητες, τα είδη και τις προδιαγραφές των προϊόντων, δηλώσεις, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όροι και προϋποθέσεις πώλησης και παράδοσης, απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα www.bejo.com.

Xanthomonas campestris pv. campestris

H Bejo Zaden ελέγχει όλες τις σπορομερίδες των ποικιλιών Brassica για την παρουσία του βακτηρίου *Xanthomonas campestris* pv. *campestris*, που προκαλεί την ασθένεια της μαύρης σήψης. Αυτό γίνεται με τη χρήση μιας μεθόδου ανίχνευσης σύμφωνα με το πρωτόκολλο που εγκρίθηκε από το Naktuinbouw (Υπηρεσία Επιθεώρησης Ολλανδίας για την Λαχανοκομία). Η Bejo Zaden έχει πιστοποιηθεί από το Naktuinbouw να ελέγχει τις σπορομερίδες σύμφωνα με το σύστημα NAL (Naktuinbouw Accredited Laboratories). Μόνο σπορομερίδες από τις οποίες έχει ληφθεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα και έχει βρεθεί να είναι απαλλαγμένο από το βακτήριο *Xanthomonas campestris* pv. *campestris* παραδίδεται.

Αποποίηση ευθυνών για Clubroot

Η υψηλή ανθεκτικότητα (HR) ποικιλιών σε διαφορετικές φυλές του *Plasmodiophora brassicae*, το οποίο παθογόνο προκαλεί το Clubroot. Ωστόσο, εάν το έδαφος είναι μολυσμένο με το μύκητα Clubroot, τότε ο παραγωγός πρέπει πρώτα να δοκιμάσει την ποικιλία, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι είναι ανθεκτική στα υπάρχοντα στελέχη του μύκητα. Καλλιεργητικά μέτρα όπως το ασβέστωμα, η αποστράγγιση, η εφαρμογή ασβεστούχων λιπασμάτων και η αμειψισπορά των καλλιεργειών μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της επίπτωσης του Clubroot.

Δήλωση Γ.Τ.Ο. (GMO)

Όλες οι ποικιλίες που περιγράφονται στον κατάλογο αυτό, λαμβάνονται μέσω μεθόδων αναπαραγωγής φυτών που δεν είναι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (Γ.Τ.Ο.) ή μεθόδων που εξαιρούνται βάσει της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ.

GLOBALG.A.P.

Θα βρείτε τα σχόλια και τις απαντήσεις της Bejo όσον αναφορά τις ερωτήσεις για το πολλαπλασιαστικό υλικό της GLOBALG.A.P. στην ιστοσελίδα μας www.bejo.com.

Τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Σημαντική Σημείωση: Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Η παράνομη αναπαραγωγή ή / και η εκμετάλλευση απαγορεύεται. Παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών μπορεί να αποτελέσει σοβαρό αδίκημα που είναι το αντικείμενο ποινικής δίωξης από τον Νόμο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: www.bejo.com/conditions-and-declarations.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Η εξερεύνηση της φύσης
δεν σταματάει ποτέ



L. Lambrou Agro Ltd

Οθέλλου 11 | Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου, 2540 Δάλι | Λευκωσία | Κύπρος
T +357 22667908 | **E** info@lambrouagro.com.cy | **W** www.lambrouagro.com.cy