




ESPECIALISTAS EN BIOCIDAS  
BIOCIDE EXPERTS



**Κατάλογος**

# Cipergen

[ Υγρό Γαλακτωματοποίησιμο  
Εντομοκτόνο ]



- Ευρύ φάσμα δράσης
- Υψηλή αποτελεσματικότητα
- Χαμηλό κόστος εφαρμογής



## Καταπολεμεί



Κουνούπια



Μύγα



Ψύλλοι



Τσιμπούρι



Κατσαρίδα



Ακάρεα

## Εφαρμογή



Νεφελοψεκασμός Ψεκασμός

## Διαθέσιμο σε



250 ml 1 L 5 L

### Δοσολογία:

Ψεκασμός:

Πορώδεις επιφάνειες: 10 ml / 1 λίτρο νερού → 5-10m<sup>2</sup>

Μη πορώδεις επιφάνειες: 10 ml / 1 λίτρο νερού → 10-20m<sup>2</sup>

Νεφελοψεκασμός:

100 ml / 1 λίτρο νερού → 500m<sup>3</sup>

### Φάσμα δράσης

#### Μύγα

- Musca domestica
- Haematobia irritans Stomoxys calcitrans
- Eristalix tennix
- Fannia canicularis
- Psychoda spp.

#### Κουνούπια

- Culex spp.
- Aedes spp.
- Anopheles spp.

#### Ψύλλοι & ψείρες

- Linognathus spp.
- Haematopinus spp.
- Solenopotes spp.
- Eoimenacanthus spp.
- Ctenocephalides canis
- Ctenocephalides felis
- Pullex irritans
- Xenopsylla cheopis
- Ceratophyllus gallinae
- Spilopsyllus cuniculi

#### Ακάρεα

- Dermanyssus gallinae
- Cheyletiella spp.
- Sarcoptes scabiei
- Psoroptes bovis
- Chorioptes bovis
- Chinchorros
- Ornithodoros spp.

#### Τσιμπούρια

- Ixodes spp.
- Rhipicephalus spp.
- Dermacentor spp.
- Haemaphysalis spp.

#### Αλογόμυγα

- Fam. Tabanidae

#### Σφήκα

- Vespa velutina
- Vespa vulgaris

#### Σκαθάρι

- Alphitobius diaperinus



### Σύνθεση

(Υγρό Γαλακτωματοποίησης)

Cypermethrin 10,00%

### Κύριες ιδιότητες

- Πυρεθροειδές εντομοκτόνο τελευταίας γενιάς με ευρύ φάσμα δράσης.
- Συνιστάται για όλα τα είδη κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
- Συνιστάται ειδικά για τα σφαγεία & τη βιομηχανία τροφίμων.

### Οδηγίες χρήσης

Μόλις το εντομοκτόνο αραιωθεί σε νερό, ψεκάστε το απευθείας σε στέγες, δάπεδα, τοίχους, παράθυρα και άλλα μέρη όπου συχνάζουν τα έντομα. Το Cipergeren είναι πιο αποτελεσματικό εάν οι επιφάνειες είναι καθαρές και ελαφρώς πορώδεις.

### Βασικά πλεονεκτήματα

- Άμεση δράση
- Πολύ αποτελεσματικό.
- Χαμηλό κόστος εφαρμογής
- Ασφαλές για ανθρώπους και ζώα. Χαμηλή τοξικότητα
- Χρόνος αναμονής 2 ώρες

### Αδειοδότηση

Αρ. άδειας: B1111

# Finigen Plus

[ Συμπυκνωμένο Εντομοκτόνο-  
Ακαρεοκτόνο ]



- Υψηλή αποτελεσματικότητα  
(συνδυασμός 2 δραστικών ουσιών)
- Ταχύτατη δράση
- Μέγιστη διάρκεια

 **bioplagen**

Especialistas en biocidas



## Καταπολεμεί



Μύγα



Ακάρεια



Κουνούπι



Σκαθάρι



Ψύλλοι



Τσιμπούρια



Κατσαρίδα

## Εφαρμογή



Νεφελοψεκασμός Ψεκασμός

## Διαθέσιμο σε



60 ml 250 ml 500 ml 1 L 5 L

## Δοσολογία

Ψεκασμός:

Πορώδεις επιφάνειες: 10 ml / 1 λίτρο νερού → 5-10m<sup>2</sup>

Μη πορώδεις επιφάνειες: 10 ml / 1 λίτρο νερού → 10-20m<sup>2</sup>

Νεφελοψεκασμός:

100 ml / 1 λίτρο νερού → 500m<sup>3</sup>

## Φάσμα δράσης

### Μύγα

- *Musca domestica*
- *Haematobia irritans* *Stomoxys calcitrans*
- *Eristalis tennix*
- *Fannia canicularis*
- *Psychoda* spp.

### Κουνούπια

- *Culex* spp.
- *Aedes* spp.
- *Anopheles* spp.

### Ψύλλοι & Ψείρες

- *Linognathus* spp.
- *Haematopinus* spp.
- *Solenopotes* spp.
- *Eoemenacanthus* spp.
- *Ctenocephalides canis*
- *Ctenocephalides felis*
- *Pullex irritans*
- *Xenopsylla cheopis*
- *Ceratophyllus gallinae*
- *Spiropsyllus cuniculi*

### Ακάρεια

- *Dermanyssus gallinae*
- *Cheyletiella* spp.
- *Sarcoptes scabiei*
- *Psoroptes bovis*
- *Chorioptes bovis*
- *Chinchorros*
- *Ornithodoros* spp.

### Τσιμπούρια

- *Ixodes* spp.
- *Rhipicephalus* spp.
- *Dermacentor* spp.
- *Haemaphysalis* spp.

### Αλογόμυγα

- Fam. *Tabanidae*

### Σφήκα

- *Vespa velutina*
- *Vespa vulgaris*

### Σκαθάρι

- *Alphitobius diaperinus*



Ιδανικό για

## Σύνθεση (Υγρό Γαλακτωματοποίησης)

Cypermethrin 3% w/v, Acetamiprid 3% w/v

## Κύριες Ιδιότητες

Υψηλής αποτελεσματικότητας. Με άμεση δράση σε χαμηλές συγκεντρώσεις λόγω της ουσίας Cypermethrin, και με μεγάλη υπολειμματικότητα αφού περιέχει επίσης Acetamiprid. Το Acetamiprid επιφέρει προνυμφοκτόνο δράση και λιγότερες γνωστές ανθεκτικότητες που σε συνδυασμό με την άμεση δράση του Cypermethrin συνθέτουν υψηλή συνεργιστική δράση.

## Οδηγίες χρήσεις

Πριν από την χρήση του FINIGEN® PLUS, τα οργανικά απόβλητα και οι ακαθαρσίες πρέπει να απομακρύνονται από την περιοχή εφαρμογής. Ο καθαρισμός της προσβεβλημένης επιφάνειας θα οδηγήσει σε καλύτερη εγκατάσταση του προϊόντος και θα αυξήσει την περίοδο δράσης του. Το FINIGEN® PLUS πρέπει να εφαρμόζεται απευθείας πάνω στην επιφάνεια όπου συνήθως υπάρχουν έντομα καθώς και σε άλλα σημεία όπου μπορεί να κρύβονται όπως τρύπες και σχισμές.

## Βασικά πλεονεκτήματα

- Υψηλή αποτελεσματικότητα (συνδυασμός 2 δραστικών ουσιών).
- Ταχύτατη δράση.
- Μεγάλη διάρκεια.
- Χρόνος αναμονής 1 ώρα.

## Αδειοδότηση


Αρ. άδειας: B1578




Especialistas en biocidas

# Ciperogen 5DP

[ Εντομοκτόνο σε μορφή  
σκόνης ]



- Δράση που διαρκεί για εβδομάδες
- Υψηλή αποτελεσματικότητα
- Κατάλληλο για βαδιστικά έντομα.



## Καταπολεμεί



Μύγα



Ψύλλοι



Ψείρα



Σκαθάρι




Τσιμπούρια



Ακάρεα

## Εφαρμογή



Σκόνη

## Διαθέσιμο σε



5 Kg 25 Kg

**Δοσολογία:** 20g/m<sup>2</sup> (1κιλό ανά 50m<sup>2</sup>)

### Φάσμα δράσης

#### Ψύλλοι & Ψείρες

- Linognathus spp.
- Haematorpinus spp.
- Solenopotes spp.
- Eomenacanthus spp.
- Ctenocephalides canis
- Ctenocephalides felis
- Pullex irritans
- Xenopsylla cheopis
- Ceratophyllus gallinae
- Spilopsyllus cuniculi

#### Σκαθάρι

- Alphitobius diaperinus

#### Ακάρεα

- Dermanyssus gallinae
- Cheyletiella spp.
- Sarcoptes scabiei
- Psoroptes bovis
- Chorioptes bovis

#### Chinchorros

- Ornithodoros spp.

#### Ψύλλοι

- Ixodes spp.
- Rhipicephalus spp.
- Dermacentor spp.
- Haemaphysallis spp.

#### Μυρμήγκια

- Rheidole pallidula
- Crematogaster scutellaris
- Tetramorium caespitum
- Tapinoma nigerrimum
- Lasius niger/grandis
- Plagiolepis pygmaea



### Σύνθεση (Σκόνη επίπασης)

Cypermethrin 5,00%

### Κύριες ιδιότητες

Πυρεθροειδές εντομοκτόνο το οποίο δρα δια επαφής και κατάποσης ενάντια σε ένα ευρύ φάσμα εντόμων και ακάρεων. Χαρακτηρίζεται από την άμεση αποτελεσματικότητα και την υψηλή υπολειμματική δράση ακόμη και σε χαμηλές δόσεις κατά των ενηλίκων εντόμων, των προνυμφών και με δευτερεύων δράση έναντι των αυγών.

Το Cipergeren 5DP είναι εντομοκτόνο για χρήση σε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών μονάδων, κλουβιά και άλλες εγκαταστάσεις ζώων.

### Οδηγίες χρήσης

Πριν να εφαρμόσετε το προϊόν, αφαιρέστε από της περιοχές που θα γίνει εφαρμογή του προϊόντος τα οργανικά απόβλητα. Εφαρμόστε το προϊόν στην απουσία ζώων και εμποδίστε την είσοδο τους από την περιοχή εφαρμογής.

Εφαρμόστε το CIPERGEN® 5 DP απευθείας στην επιφάνεια όπου τα έντομα περνούν ή κάθονται.

### Βασικά πλεονεκτήματα

- Μεγάλη αποτελεσματικότητα
- Ασφαλές για ανθρώπους και ζώα. Χαμηλή τοξικότητα.
- Η δράση του διαρκεί για εβδομάδες

### Αδειοδότηση

Αρ. άδειας: B1261



**bioplagen**

Especialistas en biocidas

# Sanivir Plus

Απολυμαντικό ευρέως φάσματος - Εντομοκτόνο



- Απολυμαίνει & Απεντομώνει με μόλις μια εφαρμογή
- Εξοικονομεί χρόνο και κόστος
- Ευρύ φάσμα: Βακτήρια, μύκητες, ιούς, έντομα και ακάρεα





## Καταπολεμεί



Βακτήρια



Μύκητες



Ιοί



Σπόρια



Μύγα



Κουνούπια



Ψύλλοι



Ακάρια



Σκαθάρι



Τσιμπούρια

## Εφαρμογή



Νεφελοφεκασμός



Ψεκασμός



Πλύση

## Διαθέσιμο σε



250 ml 1 L 5 L

## Δοσολογία: 1 λίτρο διαλύματος για κάλυψη 10-20m<sup>2</sup>

Μεθόδοι απολύμανσης	% (V/V) ο (P/P)	Dilution
·Αεροψεκασμός	0,12%	1:800
·Ψεκασμός για εργαλεία και βιομηχανία τροφίμων	0,15%	1:600
· Κανονική απολύμανση	0,30%	1:300
·Απολύμανση για οργανικούς παράγοντες, υποδήματα, φορητά, οχήματα, ρυμουλκούμενα κλπ.	0,50%	1:200
· Απολύμανση μετά από ξέσπασμα μιας νόσου	1,00%	1:100
· Νεφελοψεκασμός / Μέγιστη εντομοκτόνος δράση	10,00%	1:10

## Εύρος καταπολέμησης

### Ιοί

Síndrome de Baja postura .....	ADENOVIRIDAE
Enteritis hemorrágica en pavos .....	ADENOVIRIDAE
Enfermedad de GUMBORO .....	BIRNAVIRIDAE
Anemia infecciosa aviar .....	CIRCOVIRIDAE
Bronquitis infecciosa .....	CORONAVIRIDAE
Enfermedad de MAREK .....	HERPESVIRIDAE
Enfermedad de AUJEZSKY .....	HERPESVIRIDAE
Laringotraqueítis aviar .....	HERPESVIRIDAE
Influenza aviar .....	ORTHOMYXOVIRIDAE
Enfermedad de NEWCASTLE .....	PARAMYXOVIRIDAE
Viruela Aviar .....	POXVIRIDAE
Peste porcina africana .....	ASFARVIRIDAE
PRRS .....	ASTERVIRIDAE
Mixomatosis de los conejos .....	POXVIRIDAE
Circovirus porcina .....	CIRCOVIRIDAE
Peste porcina clásica .....	FLAVIVIRIDAE
Parvovirus porcino .....	PARVOVIRIDAE
Fiebre aftosa del ganado .....	PICORNAVIRIDAE
Mixomatosis de los conejos .....	POXVIRIDAE

### Μύκητες & Σπόρια

Aspergilosis .....	Aspergillus spp.
Candidiasis .....	Candida albicans

### Έντομα

Fly	Beetle
Hippobosca equina	Alphitobius diaperinus
Musca domestica	
Eristalix tennix	Flea
Hydrotaea irritans	Linognathus spp.
Psychoda spp.	Haematopinus spp.
Mosquito	Tick
Aedes aegypti	Ornithodoros spp.
Aedes albopictus	
Wasp	Mite
Vespa velutina	Dermanyssus
Vespula vulgaris	gallinae

### Βακτήρια

Campylobacteriosis .....	Campylobacter spp.	Bordetellosis .....	Bordetella bronchiseptica
Colibacillosis .....	Escherichia coli	Disentería porcina .....	Brachyspira hyodysent.
Coriza infeccioso .....	Haemophilus paragallinarum	Brucellosis .....	Brucella spp.
Listeriosis .....	Listeria monocytogenes	Erisipela .....	Erysipelothrix rhusiopathiae
Mycoplasmosis .....	Mycoplasma gallisepticum	Diarrea por E. coli .....	Escherichia coli
Sinovitis infecciosa .....	Mycoplasma synoviae	Artritis .....	Mycoplasma hyosynoviae
Pasteurellosis aviar .....	Pasteurella multocida	Anemia y agalactia .....	Mycoplasma suis
Salmonellosis .....	Salmonella spp.	Epidermitis exudativa .....	Staphylococcus spp.
Enfermedad Tifoidea aviar .....	Salmonella spp.	Brucellosis bovina .....	Brucella spp.
Staphylococcosis .....	Staphylococcus spp.	Basquilla o Enterotoxemia .....	Clostridium spp.
Streptococcosis .....	Streptococcus spp.	Tuberculosis bovina .....	Mycobacterium bovis

**Σύνθεση** (Υγρό Γαλακτωματοποίησης)  
 Glutaraldehyde 15,00% Cypermethrin 10,00%  
 Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride 10,00%

## Κύριες ιδιότητες

- Απολυμαντικό και εντομοκτόνο ευρέως φάσματος.
- Συνιστάται για απολύμανση σε: Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, Στάβλους, χώρους αρμέγματος, γαλακτοκομεία, Οργανικά Απόβλητα, Οχήματα Μεταφοράς Ζώων, Εκκολαπτήρια, Σφαγεία, Επιφάνειες (δάπεδα & τοίχοι), Εργαλεία.

## Οδηγίες χρήσης

Πριν την εφαρμογή του προϊόντος απομακρύνετε τα οργανικά απόβλητα (ούρα, περιττώματα) και τα ζώα. Εφαρμόστε το Sunivir Plus με ψεκασμό κατευθείαν στις επιφάνειες ενώ το έχετε διαλύσει σε νερό σύμφωνα με τις προτεινόμενες αναλογίες.

## Κύρια πλεονεκτήματα

- Τριπλή δράση: Καθαρίζει, απολυμαίνει και απεντομώνει με μία μόνο εφαρμογή.
- Εξοικονομεί χρόνο και κόστος.
- Ευρύ φάσμα δράσης.
- Χρόνος αναμονής: 4 ώρες.

## Αδειοδότηση

Αρ. άδειας: B189



Especialistas en biocidas

# Sanivir Smoke

[Απολυμαντικό καπνού]



- Ευρύ φάσμα:  
(Βακτήρια, Μύκητες, Ιούς, κ.α.)
- Ξηρός καπνός  
Χωρίς υπολείμματα
- Εύκολο στη χρήση  
Εξοικονόμηση χρόνου

 **bioplagen**

Especialistas en biocidas



## Καταπολεμεί



Βακτήρια

Μυκήτες

Ιοί


Σπόρια

## Εφαρμογή



Καπνός

## Διαθέσιμο σε



15 g

25 g

200 g

1 Kg

Δοσολογία: 1 g / 2 m<sup>3</sup> όγκου

### Φάσμα δράσης

#### Ιοίς

Síndrome de Baja postura .....	ADENOVIRIDAE
Enteritis hemorrágica aviar .....	ADENOVIRIDAE
Enfermedad de GUMBORO .....	BIRNAVIRIDAE
Anemia infecciosa aviar .....	CIRCOVIRIDAE
Bronquitis infecciosa .....	CORONAVIRIDAE
Enfermedad de MAREK .....	HERPESVIRIDAE
Laringotraqueitis aviar .....	HERPESVIRIDAE
Influenza aviar .....	ORTHOMYXOVIRIDAE
Enfermedad de NEWCASTLE .....	PARAMYXOVIRIDAE
Viruela Aviar .....	POXVIRIDAE
Peste porcina africana .....	ASFARVIRIDAE
PRRS .....	ASTERVIRIDAE
Circovirus porcina .....	CIRCOVIRIDAE
Peste porcina clásica .....	FLAVIVIRIDAE
Enfermedad de AUJEZSKY .....	HERPESVIRIDAE
Parvovirus porcino .....	PARVOVIRIDAE
Fiebre aftosa del ganado .....	PICORNAVIRIDAE
Mixomatosis de los conejos .....	POXVIRIDAE

#### Βακτήρια

Campylobacteriosis .....	Campylobacter spp.
Colibacilosis .....	Escherichia coli
Coriza infecciosa ...	Haemophilus paragallin.
Listeriosis .....	Listeria monocytogenes
Mycoplasmosis .	Mycoplasma gallisepticum
Sinovitis infecciosa ...	Mycoplasma synoviae
Pasteurellosis aviar ...	Pasteurella multocida
Salmonelosis .....	Salmonella spp.
Enfermedad Tifoidea aviar...	Salmonella spp.
Staphylocosis .....	Staphylococcus spp.
Streptocosis .....	Streptococcus spp.
Bordetellosis .....	Bordetella bronchiseptica
Disentería porcina ..	Brachyspira hyodysent.
Brucelosis .....	Brucella spp.
Erisipela .....	Erysipelothrix rhusiopathiae
Diarrea por E. coli .....	Escherichia coli
Artritis .....	Mycoplasma hyosynoviae
Anemia y agalactia .....	Mycoplasma suis
Epidemitis exudativa ..	Staphylococcus spp.
Brucelosis bovina .....	Brucella spp.
Basquilla o Enterotoxemia ..	Clostridium spp.
Tuberculosis bovina ...	Mycobacterium bovis

#### Μύκητες & Σπόρια

Aspergilosis .....	Aspergillus spp.
Candidiasis .....	Candida albicans

**Σύνθεση** (Κερί που παράγει απολυμαντικό καπνό)  
Orthophenylphenol 7,00%  
Glutaraldehyde 3,50%

### Κύριες ιδιότητες

- Απολυμαντικό καπνού ευρέως φάσματος.
- Γρήγορη και εκτεταμένη κάλυψη του καπνού σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής
- Συνιστάται για:
  - Κτηνοτροφικές & Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
  - Σιλό, φορτηγά (μεταφορά ζώων & ζωοτροφές).

### Οδηγίες χρήσης

Ανάλογα με την επιφάνεια των εγκαταστάσεων υπολογίστε την απαιτούμενη ποσότητα Sanivir Fumígeno που θα χρησιμοποιηθεί. Ανάψτε το φυτίλι και απομακρυνθείτε από την περιοχή. Κρατήστε το δωμάτιο κλειστό και κενό από ανθρώπους και ζώα. Εξαερίστε καλά πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το χώρο εφαρμογής.

### Βασικά πλεονεκτήματα

- Εύκολο στη χρήση.
- Ξηρός καπνός. Χωρίς υπολείμματα.
- Μη τοξικό.
- Σκοτώνει άμεσα μικροοργανισμούς.
- Εγκρίθηκε από το τμήμα Γεωργίας της Ισπανίας για την απολύμανση αυγών για εκκόλαψη.
- **Χρόνος αναμονής: 6 ώρες.**

### Αδειοδότηση

Αρ. άδειας: B1559

Τύπος προϊόντων: ΤΠ3  
Κτηνιατρική υγιεινή  
Μορφή: FU Καπνογόνο



Especialistas en biocidas

# Camaleon GOLD



**Σύνθεση** (Υγρό Γαλακτωματοποίησης)  
Azamethiphos 10,00%

## Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο

### Καταπολεμεί



Κουνούπια



Μύγα



Ψύλλοι



Τσιμπούρι



Μυρμήγκι



Κατσαρίδα



Ακάρεα



Ψείρα

### Εφαρμογή



Νεφελοψεκασμός Ψεκασμός

### Δοσολογία:

Ψεκασμός:  
Πορώδεις επιφάνειες: 5-10ml / 1 λίτρο νερού → 5-10m<sup>2</sup>  
Μη πορώδεις επιφάνειες: 5-10ml / 1 λίτρο νερού → 10-20m<sup>2</sup>

Νεφελοψεκασμός:  
50ml / 1 λίτρο νερού → 500m<sup>3</sup>

### Φάσμα δράσης

#### Μύγες

- Musca domestica
- Haematobia irritans
- Eristalix tennix
- Fannia canicularis
- Psychoda spp.

#### Κουνούπια

- Culex spp.
- Aedes spp.
- Anopheles spp.

#### Ψύλλοι & Ψείρες

- Linognatus spp.
- Haematopinus spp.
- Solenopotes spp.
- Eomenacanthus spp.
- Ctenocephalides canis
- Ctenocephalides felis
- Pullex irritans
- Xenopsylla cheopis
- Ceratophyllus gallinae
- Spilopsyllus cuniculi

#### Ακάρεα

- Dermanyssus gallinae
- Cheyletiella spp.
- Sarcoptes scabiei
- Psoroptes bovis
- Chorioptes bovis
- Ornithodoros spp.

#### Τσιμπούρια

- Ixodes spp.
- Rhipicephalus spp.
- Dermacentor spp.
- Haemaphysalis spp.

#### Αλογόμυγα

- Fam. Tabanidae

#### Σκαθάρι

- Alphitobius diaperinus

### Κύριες Ιδιότητες

- Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο με ευρύ φάσμα και μακράς διάρκειας δράση.
- Για χρήση σε όλες τις πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

### Οδηγίες Χρήσης

Αραιώστε στο νερό και ψεκάστε κατευθείαν στο έδαφος, παράθυρα και γενικά στις επιφάνειες που συχνάζουν τα έντομα. Το προϊόν παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα σε καθαρές και σχετικά πορώδεις επιφάνειες.


### Κύρια πλεονεκτήματα

- Το μοναδικό οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο της αγοράς
- Μέγιστη διάρκεια δράσης
- Ευρύ φάσμα καταπολέμησης
- Χρόνος αναμονής **1 ώρα**

### Αδειοδότηση

Αρ. άδειας: B1530

### Διαθέσιμο σε



500 ml

5 L

# Atiza GR



**Σύνθεση** (Κοκκώδες)  
Azamethiphos 1 %

Κοκκώδες δόλωμα έτοιμο για χρήση

## Καταπολεμεί



Μύγα



Αλογόμυγα

## Εφαρμογή



Ξηρός διασκορπισμός

**Δόση:** 25g για κάλυψη 10m<sup>2</sup>

### Φάσμα Δράσης

#### Μύγα

- *Musca domestica*
- *Haematobia irritans*
- *Stomoxys calcitrans*
- *Eristalix tennix*
- *Fannia canicularis*
- *Psychoda* spp.

#### Αλογόμυγα

- Fam. Tabanidae

### Κύριες ιδιότητες

Περιέχει την δραστική ουσία Azamethiphos, την μοναδική οργανοφωσφωρική ουσία της αγοράς για χρήση ως βιοκτόνο. Με ευρύ φάσμα και μεγάλης διάρκειας δράση. Το Atiza GR παρουσιάζει επίσης αξιόλογη προσελκυστική δράση σε όλα τα είδη μυγών λόγω της παρουσίας ζάχαρης στην σύνθεσή του. Οι μύγες πεθαίνουν είτε εξ επαφής είτε με την κατάποση του δολώματος.

### Οδηγίες Χρήσεις

Εφαρμόστε το προϊόν σε μέρη που συχνάζουν οι μύγες (παράθυρα, περιβάζια, τοίχους κ.α.). Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε μικρά πιατάκια (δοχεία). Συνιστάται μικρή υγραποίηση των κόκκων σε περίπτωση πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

### Κύρια πλεονεκτήματα

- Εύκολη εφαρμογή
- Υψηλή προσελκυστικότητα
- Χαμηλή τοξικότητα

### Αδειοδότηση

Αρ. άδειας: B1531

### Διαθέσιμο σε



300 g



2 kg



# Ratolí



## Καταπολεμεί



Rattus rattus



Rattus norvegicus



Mus musculus

## Εφαρμογή



Φρέσκο δόλωμα



Χρήση σε δολωματικούς σταθμούς


## Διαθέσιμο σε




1 Kg



10 Kg  
(10x1 kg)



20 Kg  
(20x1 kg)



20 Kg  
(in Bulk)



**Σύνθεση** (φρέσκο δόλωμα)  
Bromadiolone 0,005%

## Δόση Εφαρμογής:

- Νυμφίτσες: 60-100gr ανα 5-10 m
- Ποντίκια: 50g ανα 5-10 m

## Πεδίο εφαρμογής

- Roof Rat (Rattus rattus)
- Sewer Rats (Rattus norvegicus)
- Mice (Mus musculus)
- Field Mice (Apodemus sylvaticus)
- Common Voles (Microtus duodecimcostatus)

## Κύριες Ιδιότητες

- 2ης γενεάς αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο.
- Η σύνθεση του περιέχει φυσικά προσελκυστικά και έλαια υψηλής ποιότητας.
- Υψηλή προσελκυστικότητα

## Οδηγίες Χρήσης


Φορέστε προστατευτικά γάντια πριν τη χρήση. Τοποθετείστε το δόλωμα σε σημεία που συχνάζουν τα τρωκτικά και ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα.

## Κύρια Πλεονεκτήματα

- Εύκολο στη χρήση
- Προσελκυστικότητα που διαρκεί εβδομάδες
- Δεν έχουν παρατηρηθεί ανθεκτικότητες
- Τα τρωκτικά πεθαίνουν μετά από κατάποση μικρής δόσης του Ratolí

## Αδειοδότηση

Αρ. Άδειας: 24



Τρωκτικοκτόνο σε μορφή κέρινων κύβων

## Καταπολεμεί



Rattus  
rattus

Rattus  
norvegicus

Mus  
musculus

## Εφαρμογή



Bait of paraffin

Χρήση σε δολωματικούς  
σταθμούς

# Ratigen

## Κύβοι παραφίνης



**Σύνθεση** (Κύβοι παραφίνης)  
Brodifacoum 0,005%

### Δόση εφαρμογής:

Νυμφίτσες: 100g δολώματος ανά 100 m<sup>2</sup>  
Ποντίκια: 40g δολώματος ανά 100 m<sup>2</sup>

### Φάσμα δράσης

- Roof Rat (Rattus rattus)
- Sewer Rats (Rattus norvegicus)
- Mice (Mus musculus)
- Field Mice (Apodemus sylvaticus)
- Common Voles (Microtus duodecimcostatus)

### Κύριες Ιδιότητες

- Αντιπηκτικό ποντικοκτόνο με υψηλή αποτελεσματικότητα και μικρή θανατική δόση κατάποσης.
- Η σύνθεση του αποτελείται από δημητριακά, παραφίνη και προσελκυστικές ουσίες.
- Υψηλή προσελκυστικότητα.

### Οδηγίες Χρήσης

Φορέστε προστατευτικά γάντια πριν τη χρήση. Τοποθετείστε το δόλωμα σε μέρη που συχνάζουν τα τρωκτικά και ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Προτείνεται ειδικά για εξωτερική χρήση.

### Κύρια Πλεονεκτήματα

- Έτοιμα και εύκολα στη χρήση.
- Ανθεκτικά στο νερό.
- Υψηλή προσελκυστικότητα.
- Δεν έχουν παρατηρηθεί ανθεκτικότητες.

### Αδειοδότηση

Αρ. Άδειας: 55

### Διαθέσιμο σε



3 Kg  
(in Bulk)

20 Kg  
(in Bulk)





ESPECIALISTAS EN BIOCIDAS  
BIOCIDE EXPERTS

Avda. Castilleja de la Cuesta, 26 (PIBO)  
41110 - Bollullos de la Mitación (Sevilla)  
Tlf.: 955 77 65 77 - Fax: 955 77 65 66  
bioplagen@bioplagen.com  
www.bioplagen.com



Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
Una manera de hacer Europa