



ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ - ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ

Εγγυημένη σύνθεση: Maltodextrin: 47,6 % (β/ο) Βοηθητικές ουσίες: 60% (β/β)

ERADICOAT® MAX

Εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο επαφής με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως Αλευρωδών και Ακάρεων. Περιέχει τη δραστική ουσία maltodextrin, η οποία δρα εναντίον των εντόμων με μηχανικό τρόπο, παρεμποδίζοντας την αναπνοή προκαλώντας τους ασφυξία ή ακινητοποιώντας τα στην επιφάνεια των φύλλων.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P405+ P102 Φυλάσσετε κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. P270 Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P261 Αποφύγετε να αναπνεύσετε αερωμάτα. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα αποτομικής προστασίας για τα χέρια / πρόσωπο. Φοράτε γάντια, ολόσωμο προστατευτικό ενδυμασία και προσωπικά κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού. P501 Διάθεση του περιεχόμενου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. SP1

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κατά τις επόμενες 48 ώρες / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης ή της λιθωστρώσεως επιφανείας και τους δρόμους). SPe3 Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους, να αφήσετε απήκαστη μία (1) ώρα προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη. SPe8 Επικίνδυνο για τις μέλισσες.

Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικίνδυνη μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας (ζιζανίων). Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι. P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μην χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα. Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

Ομάδα Τρόπου Δράσης: --

Συνδυαστικότητα: ---

Κάτοχος της άδειας: CERTIS BELCHIM B.V.



Διανομέας: L. LAMBROU AGRO LTD

Οθέλλου 11, Βιομ. Περιοχή Ιδαίου,
2540 Δάφνι, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22667908
info@lambrouagro.com.cy
www.lambrouagro.com.cy

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

5 λίτρα

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική φραγμένη συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα ή σχισμό, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



Πεδίο Εφαρμογής - Στόχοι - Δόσεις: Καλλιέργειες θερμοκηπίου (A1, F): Σολανώδη (Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Πιπεριά Chili, Πεπόνι, Πατάτα), Κολοκυνθοειδή (Αγγούρι, Κολοκύθα, Πεπόνι, Κραμπουδί, Κολοκύθα), Κραμβοειδή (Αγλιανο Λευκό, Αγλιανο Κόκκινο, Λάχανο Σαντο, Λαχανάκια Βρυξελλών, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο Κινέζικο, Λάχανο Σγουρό/Λαχανίδα), Φυλλώδη Λαχανικά (Αντιόδια, Αντρέακια, Βλίθο, Γαιοκάρδαμο, Κάρδαμο, Καυκαλήθρα, Λάπαθο, Λυκοτριβόλο, Μαρούλι, Μαρούλι κατασάρδο, Νεροκάρδαμο, Ραβίτα, Ραβίτα witloof, Ρόκα, Σινάπι Κόκκινο, Σκαρόλες, Σπανάκι, Σταμαναγκάθι), Ψυχανθή / Ψωπάρια (Κουκιά, Ρεβίθια, Φακές, Φασόλια με & χωρίς λοβό, Χλωρά, Κόκκινα, Λίμα, Μπιζέλια με & χωρίς λοβό, Βίκος, Λαθούρι, Λούπινα, Αμπελοφάσουλα, Αραχίδα), Βολβώδη Λαχανικά (Κρεμμύδι ξηρό, Κρεμμύδι φρέσκο, Σκόρδο, Πράσο, Σχουμπράσσο, Ασκαλιώνο, Ραπανάκι, Καρότο), Αρωματικά & Φαρμακευτικά φυτά (Ανηθός, Αρώνια, Βασιλικός, Γιασεμί, Γλυκάνισος, Δυόσμος, Δάφνη, Δενδρολίβανο, Δίκταμο, Εστραγκόν, Θυμάρι, Κάππαρη, Κολιανδρός, Κύμινο, Λεβάντα, Μαιντανός, Μάραθος, Μαντζουράνα, Μελισσόχορτο, Μέντα, Ρίγανη, Σάββα, Σέλινο, Σχουμπράσσο, Ψωσώπι, Φασκόμηλο, Χαμομήλι), Καλλωπιστικά (Αζαλέα, Αλεξανδρινό, Αφρικανική Βιολέτη, Γαρυφαλίδα, Γλαδιόλιος / Γυψοφίλη, Ζέρμπερα, Κυκλάμινα, Μπιγόνια, Ντάλια, Ορτανσία, Πελαργόχορτο, Πριμούλα, Τουλίπα, Τριανταφυλλιά, Σαμπόκος, Χρυσάνθεμο), Φράουλα, Καπνοσπορέα: Αλευρωδείς (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*) Δόση: 2 λίτρα / 100 λίτρα ψεκ. υγρού Όγκος ψεκ. υγρού: 20-300 λίτρα / δεκ Μέγιστη: 6 λίτρα σκ. / δεκ. **Εσπεριδοειδή (B1, B2)** (Πορτοκαλιά, Περναμόντα, Νεράντζια, Λεμονιά, Κιτρολέμονα, Μανταρινιά, Κλημεντίνη, Γκρέιφ φρουτ, Φράπες, Πρίσινο λεμόνι (Λάιμ)): Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*, *Panonychus citri*), Κοκκοειδή (*Planococcus sp.*, *Icerya purchasi*, *Deltoacoccus abietis*) Δόση: 1-1,5 λίτρα / 100 λίτρα ψεκ. υγρού Όγκος ψεκ. υγρού: 100-300 λίτρα / δεκ Μέγιστη: 4,5 λίτρα σκ. / δεκ. **Αχλαδιά (B1, B2):** Φύλλα αχλαδιάς (*Caspariella pyri*) Δόση: 1,5-2 λίτρα / 100 λίτρα ψεκ. υγρού Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα / δεκ Μέγιστη: 3 λίτρα σκ. / δεκ. **Αμπέλι (επιτραπέζιες ποικιλίες) (B1, B2):** Κοκκοειδή (*Planococcus ficus*, *Planococcus citri*) Δόση: 1-1,5 λίτρα / 100 λίτρα ψεκ. υγρού Όγκος ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα / δεκ Μέγιστη: 2,25 λίτρα σκ. / δεκ. **Αμπέλι (οινοποιητικές και επιτραπέζιες ποικιλίες) (F1, F2):** Ακάρεα - Eriophoridae (*Calatrimerus vitis*, *Colomerus sp.*, *Colomerus vitis*) Δόση: 1-1,5 λίτρα / 100 λίτρα ψεκ. υγρού Όγκος ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα / δεκ Μέγιστη: 2,25 λίτρα σκ. / δεκ. **Φράουλα (Y) (A1, F):** Τετράνυχος (*Tetranychus Urticae*) Δόση: 1,5-2 λίτρα / 100 λίτρα ψεκ. υγρού Όγκος ψεκ. υγρού: 20-150 λίτρα / δεκ Μέγιστη: 3 λίτρα σκ. / δεκ. **Μαρούλια και σαλατικά (Y) (A1, F)** (Μαρούλι, Ρόκα, Κόκκινο σινάπι, Κάρδαμο, Γαιοκάρδαμο, Σπανάκι, Ξεσκουλα/

φύλλα τεύλων, Σκαρόλες (πικρίδα/πλατύφυλλα αντίδια): Αφίδες (*Nasonovia ribisnigri*, *Aphis fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*) Δόση: 1,5-2 λίτρα / 100 λίτρα ψεκ. υγρού Όγκος ψεκ. υγρού: 20-150 λίτρα / δεκ Μέγιστη: 3 λίτρα σκ. / δεκ. **Σολανώδη (A1, F)** (Τομάτα (Y) Μελιτζάνα (Y) Πιπεριά (Y)): Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Αλευρωδείς (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*) Δόση: 1,5-2 λίτρα / 100 λίτρα ψεκ. υγρού Όγκος ψεκ. υγρού: 20-150 λίτρα / δεκ Μέγιστη: 3 λίτρα σκ. / δεκ. **Κολοκυνθοειδή (μη εδώδιμος φλοιός) (A1, F)** (Αγγούρι (Y), Αγγουράκι (Y), Κολοκύθη (Y)): Αλευρωδείς (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*) Δόση: 1,5-2 λίτρα / 100 λίτρα ψεκ. υγρού Όγκος ψεκ. υγρού: 20-150 λίτρα / δεκ Μέγιστη: 3 λίτρα σκ. / δεκ. **Κολοκυνθοειδή (μη εδώδιμος φλοιός) (A1, F)** (Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα Υπαίθρου): Αφίδες (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*), Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*) Αλευρωδείς (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*) Δόση: 1,5-2 λίτρα / 100 λίτρα ψεκ. υγρού Όγκος ψεκ. υγρού: 20-150 λίτρα / δεκ Μέγιστη: 3 λίτρα σκ. / δεκ. **Ακρόβοια (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά, Φιστικιά), Μπανάνια, Αβoka (Planococcus sp., Icerya purchasi, Deltoacoccus abietis) Δόση: 1-1,5 λίτρα / 100 λίτρα ψεκ. υγρού Όγκος ψεκ. υγρού: 100-300 λίτρα / δεκ Μέγιστη: 4,5 λίτρα σκ. / δεκ.**

Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής: (A) Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου. **(B)** Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή. **BVCH 69-89 (F)** Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από την έναρξη διόγκωσης των σφολιών έως την εμφάνιση των ταξιανθιών. **BVCH 01-53 (A)** Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου. **BVCH 00-89**

Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλιερ. περίοδο: (1) 20 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 3 ημερών **(2)** 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5 ημερών **(3)** 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 3 ημερών.

Παρατηρήσεις: • Στο θερμοκήπιο εφαρμόζεται με δοσολογία 2%, δηλαδή με δόση 20 κ.ε. σκευάσματος ανά 1 λίτρο νερού. • Στις καλλιέργειες θερμοκηπίου: χρήση μόνο σε θερμοκήπια κλειστού τύπου (που παρέχουν πλήρη κάλυψη μέχρι το επίπεδο του εδάφους). Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής σε θερμοκήπια και μέχρι το στέγνωμα των φύλλων, να παραμένουν κλειστά όλες οι πόρτες και τα παράθυρα. • Στις καλλιέργειες υπαίθρου: Μαρούλια και άλλα σαλατικά, Σολανώδη, Φράουλα και Κολοκυνθοειδή εφαρμόζεται με δοσολογία 15-20 κ.ε. σκευάσματος ανά 1 λίτρο νερού. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:** Δεν ορίζεται. (Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής) **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Γενικά δεν ενίομαι φυτοτοξικοί στις συνιστώμενες δόσεις εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα. Συνιστάται πριν τον ψεκασμό να γίνει δοκιμή σε μερικά φυτά. Αποφύγετε τον απευθείας ψεκασμό στα άνθη των καλλωπιστικών ειδών. Ένα κολλώδες υπόλειμμα μπορεί να παρατηρηθεί στους καρπούς ή στο φύλλωμα των λαχανικών. **Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτογενείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Εξαιτίας του τρόπου δράσης του, ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ενόμων στο ERADICOAT Max είναι εξαιρετικά απίθανο. Το ERADICOAT Max αποτελεί ένα εργαλείο στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών (IPM) και για τη διατήρηση αναπτυχθείς ανθεκτικότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εναλλαγή με συμβατικά, χημικά, διασυστηματικά εντομοκτόνα και ακαρεοκτόνα. **Προληπτικά μέτρα για την προστασία των υφέλμων αρθροπόδων:** Το ERADICOAT Max μπορεί να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις σε αρθρόποδα μη-στόχους που έρχονται σε επαφή με το ψεκαστικό διάλυμα. Σε θερμοκήπια που γίνεται εφαρμογή του ERADICOAT Max, η εξσπολήση υφέλμων αρθροπόδων, να γίνεται μόνο μετά το στέγνωμα των φυλλών. **Τρόπος Εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:** Ανακινήστε καλά τη συσκευασία του σκευάσματος πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Καθαρισμός ψεκαστικού μηχανήματος:** Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του βυθίου και όλων των εξαρτημάτων. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυθίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυθίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τριπλ (3) φορές με καθαρό νερό.

δη, Φράουλα και Κολοκυνθοειδή εφαρμόζεται με δοσολογία 15-20 κ.ε. σκευάσματος ανά 1 λίτρο νερού.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Δεν ορίζεται. (Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής)

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Γενικά δεν ενίομαι φυτοτοξικοί στις συνιστώμενες δόσεις εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα. Συνιστάται πριν τον ψεκασμό να γίνει δοκιμή σε μερικά φυτά. Αποφύγετε τον απευθείας ψεκασμό στα άνθη των καλλωπιστικών ειδών. Ένα κολλώδες υπόλειμμα μπορεί να παρατηρηθεί στους καρπούς ή στο φύλλωμα των λαχανικών. **Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτογενείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Εξαιτίας του τρόπου δράσης του, ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ενόμων στο ERADICOAT Max είναι εξαιρετικά απίθανο. Το ERADICOAT Max αποτελεί ένα εργαλείο στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών (IPM) και για τη διατήρηση αναπτυχθείς ανθεκτικότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εναλλαγή με συμβατικά, χημικά, διασυστηματικά εντομοκτόνα και ακαρεοκτόνα. **Προληπτικά μέτρα για την προστασία των υφέλμων αρθροπόδων:** Το ERADICOAT Max μπορεί να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις σε αρθρόποδα μη-στόχους που έρχονται σε επαφή με το ψεκαστικό διάλυμα. Σε θερμοκήπια που γίνεται εφαρμογή του ERADICOAT Max, η εξσπολήση υφέλμων αρθροπόδων, να γίνεται μόνο μετά το στέγνωμα των φυλλών. **Τρόπος Εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: Ανακινήστε καλά τη συσκευασία του σκευάσματος πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Καθαρισμός ψεκαστικού μηχανήματος:** Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του βυθίου και όλων των εξαρτημάτων. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυθίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυθίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τριπλ (3) φορές με καθαρό νερό.

UFI: E6YW-HOTP-700U-J4WW

PES040/5L/12.12.2022

HΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ /
HΜΕΡ. ΑΝΗΣ /
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

