



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αίτηση με αρ. 970 (Έντυπο 09), ημερομηνίας 14/04/2025, για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος και τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης,
- την αίτηση με αρ. 261 (Έντυπο 10), ημερομηνίας 14/04/2025, για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με το φάσμα δράσης (προσθήκη καλλιεργειών **μηλοειδών, πυρηνόκαρπων, φουντουκιάς, ακτινίδιου**), το υλικό συσκευασίας, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα,
- την αίτηση με αρ. 70 (Έντυπο 11), ημερομηνίας 14/04/2025, για διεύρυνση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε χρήσεις ήσσονος σημασίας

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **ERADICCOAT MAX**.....ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3986

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

29/08/2025

Ημερομηνία λήξης άδειας:

28/02/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

CERTIS BELCHIM B.V.

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L. Lambrou Agro Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. Lambrou Agro Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Eradicoat Max

2. Μορφή: Πυκνό Διάλυμα (SL)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Maltodextrin: 47,6 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 60% (β/β)

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

CERTIS BELCHIM B.V.

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. Safapac, Ηνωμένο Βασίλειο
2. Industria Quimicas del Valles (IQV), Ισπανία
3. Schirm GmbH, Schönebeck (Elbe), Γερμανία
4. Chemark Zrt, Ουγγαρία
5. K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
6. FormiChem GmbH, Γερμανία
7. Schirm GmbH, Wolfenbüttel, Γερμανία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. Safapac, Ηνωμένο Βασίλειο
2. Industria Quimicas del Valles (IQV), Ισπανία
3. Schirm GmbH, Schönebeck (Elbe), Γερμανία
4. Chemark Zrt, Ουγγαρία
5. K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
6. FormiChem GmbH, Γερμανία
7. Schirm GmbH, Wolfenbüttel, Γερμανία

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες/Δοχεία	200 κ.εκ. έως 10 λίτρα	HDPE, F- HDPE

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Maltodextrin

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

91% β/β min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

CERTIS BELCHIM B.V.

4. Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Roquette Frères, Γαλλία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο επαφής με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως Αλευρωδών και Ακάρεων.

Περιέχει τη δραστική ουσία maltodextrin, η οποία δρα εναντίον των εντόμων με μηχανικό τρόπο, παρεμποδίζοντας την αναπνοή προκαλώντας τους ασφυξία ή ακινητοποιώντας τα στην επιφάνεια των φύλλων.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες



ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Ανακινήστε καλά τη συσκευασία του σκευάσματος πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του βυτίου και όλων των εξαρτημάτων. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		Λίτρα /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα. / δεκ.)	Λίτρα. σκ./δεκ. μέγιστη		
Καλλιέργειες θερμοκηπίου *	Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> - TRIAVA, <i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA) Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR)	2	20 – 300	6	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου.	20 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 3 ημερών
Εσπεριδοειδή: - Πορτοκαλιά CIDSΙ - Λεμονιά CIDLI - Μανταρινιά CIDRE - Γκρέιπφρουτ CIDPA - Πράσινο λεμόνι (Λάιμ) CIDAF	Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR, <i>Panonychus citri</i> - METTCI) Κοκκοειδή (<i>Planococcus</i> sp. - PLANSP, <i>Icerya purchasi</i> - ICERPU, <i>Delottococcus aberia</i> - DLTCAB)	1 – 1,5	100 – 300	4,5	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή. BBCH 69-89	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5 ημερών
Μηλοειδή: - Μηλιά MABSD - Αχλαδιά PYUCO - Κυδωνιά CYDOB - Μουσμουλιά MSPGE	Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR, <i>Panonychus ulmi</i> - METTUL)	1,5 - 2	50 -150	3	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών έως την αρχή της άνθησης (BBCH 00-60) και από το τέλος της άνθησης έως το στάδιο του ληθάργου μετά τη συγκομιδή και την πτώση των φύλλων. (BBCH 69- 99)	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5 ημερών

Αχλάδια PYUCO	Ψύλλα αχλαδιάς (<i>Cacopsylla pyri</i> - PSYLPI)	1,5 – 2	100 – 150	3	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή. BBCH 69-89	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5 ημερών
Πυρηνοκαρπα: - Βερικοκιά PRNAR - Δαμασκηνιά PRNDO - Κερασιά PRNAV	Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR, <i>Panonychus ulmi</i> - METTUL)	1,5 - 2	50 -150	3	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών, έως την αρχή της άνθησης (BBCH 00-60) και από το τέλος της άνθησης έως το στάδιο του ληθάργου μετά τη συγκομιδή και την πτώση των φύλλων (BBCH 69-99)	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5 ημερών
	Κοκκοειδή (<i>Eulcanium</i> sp. EULCSP, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> PSEAPE, <i>Pseudococcus</i> sp. PSECSP, <i>Parthenolecanium corni</i> LECACO)				Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών, από το τέλος της άνθησης έως το στάδιο του ληθάργου μετά τη συγκομιδή και την πτώση των φύλλων (BBCH 69-99)	
Ροδακινιά PRNPS	Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR, <i>Panonychus ulmi</i> - METTUL) Χρήση ήσσονος σημασίας: Ακάρεα γένους Eriophyes** <i>Eriophyes</i> sp. ERPHSP	1,5 - 2	50 -150	3	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών, έως την αρχή της άνθησης (BBCH 00-60) και από το τέλος της άνθησης έως το στάδιο του ληθάργου μετά τη συγκομιδή και την πτώση των φύλλων (BBCH 69-99)	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5 ημερών

	Κοκκοειδή (<i>Eulicanium</i> sp. EULCSP, <i>Pseudaulacaspis</i> <i>pentagona</i> PSEAPE, <i>Pseudococcus</i> sp. PSECSP, <i>Parthenolecanium</i> <i>corni</i> LECACO)				Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών, από το τέλος της άνθησης έως το στάδιο του ληθάργου μετά τη συγκομιδή και την πτώση των φύλλων (BBCH 69-99)	
Αμπέλι (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες) VITVI	Κοκκοειδή (<i>Planococcus ficus</i> - PLANFI, <i>Planococcus citri</i> - PSECCI)	1 – 1,5	50 – 150	2,25	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή. BBCH 69-89	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5 ημερών
	Ακάρεα - Eryophiidae (<i>Calepitrimerus vitis</i> - PHYCVI, <i>Colomerus</i> sp. - COOMSP, <i>Colomerus vitis</i> - ERPHVI)				Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών έως τη συγκομιδή. BBCH 01-89	
Φράουλα (Υ) FRAAN	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR)	1,5 – 2	20 – 150	3	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου. BBCH 00-89	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 3 ημερών
Μαρούλια και σαλατικά (Υ): - Μαρούλι LACSA - Ρόκα ERUVE - Κόκκινο σινάπτι BRSJR - Κάρδαμο LEPSA - Γαιοκάρδαμο BARVE - Σπανάκι SPQOL	Αφίδες (<i>Nasonovia ribisnigri</i> - NASORN, <i>Aphis fabae</i> - APHIFA, <i>Macrosiphum euphorbiae</i> - MACSEU)	1,5 – 2	20 – 150	3	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου. BBCH 00-89	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 3 ημερών.

- Σέσκουλα/φύλλα τεύτλων BEAVF - Σκαρόλες (πικρίδα)/ πλατύφυλλα αντίδια CICEL						
Σολανώδη (Υ): - Τομάτα LYPES - Μελιτζάνα SOLME - Πιπεριά CPSAN	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR) Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> - TRIAVA, <i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA)	1,5 – 2	20 – 150	3	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου. BBCH 00-89	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 3 ημερών
Κολοκυνθοειδή (εδώδιμος φλοιός) (Υ): - Αγγούρι CUMSA - Αγγουράκι CUMSA - Κολοκύθι CUUPG	Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> - TRIAVA, <i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA)	1,5 – 2	20 – 150	3	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου. BBCH 00-89	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 3 ημερών
Κολοκυνθοειδή (μη εδώδιμος φλοιός) (Υ): - Πεπόνι CUMME - Καρπούζι CITLA - Κολοκύθα CUUPE	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> - APHIGO, <i>Myzus persicae</i> - MYZUPE) Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR) Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA, <i>Trialeurodes vaporariorum</i> - TRIAVA)	1,5 – 2	20 – 150	3	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου. BBCH 00-89	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 3 ημερών
Ακρόδρυα: - Αμυγδαλιά - PRNDU - Καρυδιά	Κοκκοειδή (<i>Planococcus</i> sp. - PLANSP, <i>Icerya purchasi</i>	1 – 1,5	100 – 300	4,5	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5 ημερών

IUGRE - Φουντουκιά CYLAV - Φιστικιά PIAVE	- ICERPU, <i>Delottococcus aberia</i> - DLTCAB)				τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή. BBCH 69-89	
Μπανάνα MUBSS Αβοκάντο PEBAM Μάνγκο MNGIN Παπάγια CIAPA Ανανάς ANHCO						5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5 ημερών
Φουντουκιά CYLAV	Τετράνυχτοι (<i>Eotetranychus</i> <i>carpini</i> EOTECA, <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP)	1 - 2	50 - 150	3	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών, από το τέλος της άνθησης έως το στάδιο του ληθάργου μετά τη συγκομιδή και την πτώση των φύλλων BBCH 69-99	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5 ημερών
Ακτινίδιο ATIDE	Κοκκοειδή (<i>Pseudaulacaspis</i> <i>pentagona</i> PSEAPE, <i>Pseudococcus</i> <i>comstocki</i> PSECCO)	1 - 2	50 - 150	3	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών, από το τέλος της άνθησης έως το στάδιο του ληθάργου μετά τη συγκομιδή και την πτώση των φύλλων BBCH 69-99	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5 ημερών
Χρήση ήσσονος σημασίας: Ροδιά *** PUNGR	Αφίδες <i>Aphis punicae</i> APHIPU Ακάρεα	1,5 - 2	50 - 150	3	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών, έως την	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5 – 7 ημερών

	Τετράνυχος <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP <i>Aceria granati</i> ACEIGA				αρχή άνθησης και από το τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή BBCH 00-60 και BBCH 69-99	
Χρήση ήσσονος σημασίας: Συκιά *** FIUCA	Ακάρεα <i>Aceria ficus</i> ACEIFI Κοκκοειδή Κηροπλάστης <i>Ceroplastes rusci</i> CERPRU Ψύλλα της συκιάς <i>Homotoma ficus</i> HOMTFI	1,5 - 2	50 - 150	3	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών, έως την αρχή άνθησης και από το τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή BBCH 00-60 και BBCH 69-99	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5 – 7 ημερών
Χρήση ήσσονος σημασίας: Μαστιχόδεντρο*** (Σχίνος) PIALE	Αφίδες <i>Aploneura lentisci</i> APLNSP Κοκκοειδή Coccidae 1COCCF	1,5 - 2	50 - 150	3	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών, έως την αρχή άνθησης και από το τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή BBCH 00-60 και BBCH 69-99	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5 – 7 ημερών
Ελιά OLVEU (επιτραπέζια και ελαιοποιήσιμη)	Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Κοκκοειδή*** <i>Saissetia oleae</i> SAISOL <i>Pollinia pollini</i> POLNPO <i>Leucaspis riccae</i> LEUARI <i>Aspidiotus nerii</i> ASPDNE	1,5 - 2	50 - 150	3	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών, έως τη συγκομιδή BBCH 11-99	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5 – 7 ημερών

	<i>Lepidosaphes ulmi</i> LEPSUL Ακάρεα Eriophyidae*** 1ERIOF					
Χρήση ήσσονος σημασίας: Σπαράγγι *** ASPOF	Τετράνυχοι <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP Tetranychidae 1TETRF	1,5 - 2	20 - 150	3	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών, έως τη συγκομιδή BBCH 00-89	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 3 ημερών

Παρατηρήσεις :

- 1) Η χρήση στην Πορτοκαλιά (CIDS1) περιλαμβάνει το Περγαμόντο (CIDAB) και τη Νεραντζιά (CIDAU). Η χρήση στη Λεμονιά (CIDLI) περιλαμβάνει την Κιτριά (CIDME). Η χρήση στη Μανταρινιά (CIDRE) περιλαμβάνει και την Κλημεντίνη (CIDDE). Η χρήση στο Γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει και τη Φράππα (CIDGR). Η χρήση στη Ροδακινιά (PRNPS) περιλαμβάνει τη Νεκταρινιά (PRNPN), και η χρήση στην Κερασιά (PRNAV) περιλαμβάνει τη Βουσινιά (PRNCE).
- 2) Η μέγιστη συγκέντρωση του ψεκαστικού υγρού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1,5 λίτρα το εκατόλιτρο ή 2 λίτρα στο εκατόλιτρο ανάλογα με την καλλιέργεια και σύμφωνα με το εγκεκριμένο φάσμα δράσης.
- 3) Στις καλλιέργειες θερμοκηπίου: χρήση μόνο σε θερμοκήπια κλειστού τύπου (που παρέχουν πλήρη κάλυψη μέχρι το επίπεδο του εδάφους). Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής σε θερμοκήπια και μέχρι το στέγνωμα των φύλλων, να παραμένουν κλειστά όλες οι πόρτες και τα παράθυρα.
- 4) Στις καλλιέργειες υπαίθρου: Μαρούλια και άλλα σαλατικά, Σολανώδη, Φράουλα και Κολοκυνθοειδή εφαρμόζεται με δοσολογία 15-20 κ.εκ. σκευάσματος ανά 1 λίτρο νερού.
- 5) Η χρήση στις φράουλες υπαίθρου περιλαμβάνει και προσωρινές κατασκευές τύπου τούνελ

* Καλλιέργειες θερμοκηπίου (Θ):

Σολανώδη: Τομάτα (LYPES), Μελιτζάνα (SOLME), Πιπεριά (CPSAN), Πιπεριά Chilli (CPSFR), Πεπίνιο (SOLMU), Πατάτα (SOLTU).
Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι (CUMSA), Κολοκύθι (CUUPG), Πεπόνι (CUMME), Καρπούζι (CITLA), Κολοκύθα (CUUMA, CUUPM).
Κραμβοειδή: Λάχανο Λευκό (BRSOL), Λάχανο Κόκκινο (BRSOR), Λάχανο Savoy (BRSOS), Λαχανάκια Βρυξελλών (BRSEF), Κουνουπίδι (BRSEB), Μπρόκολο (BRSOK), Λάχανο Κινέζικο (BRSPK), Λάχανο Σγουρό /Λαχανίδα (BRSEA),
Φυλλώδη Λαχανικά: Αντίδια (CICEN), Αντράκλα (POROS), Βλήτο (AMARE), Γαιοκάρδαμο (BARVE), Κάρδαμο (LEPSA), Καυκαλήθρα (TORAP), Λάπαθο (RUMSS), Λυκοτρίβολο (VLLLO), Μαρούλι (LACSA), Μαρούλι κατσαρό (LACSP), Νεροκάρδαμο (NAAOF), Ραδίκι (CICIN), Ραδίκι witloof (CICIF), Ρόκα (DIPER/ERUVE), Σινάπι Κόκκινο (BRSJU), Σκαρόλες (CICEL), Σπανάκι (SPQOL), Σταμναγκάθι (CICIN).
Ψυχανθή/Οσπρία: Κουκιά (VICFJ, VICFE, VICFM, VICFX), Ρεβίθια (CIEAR), Φακές (LENCU), Φασόλια με & χωρίς λοβό, Χλωρά, Κόκκινα, Λίμα (PHSVX, PHSSS, PHSVN, PHSLU) Μπιζέλια με & χωρίς λοβό (PIBSX, PIBSA), Βίκος (VICAR), Λαθούρι (LTHSA), Λούπινα (LUPSS), Αμπελοφάσουλα (VIGSI), Αραχίδα (ARHHY).
Βολβώδη Λαχανικά: Κρεμμύδι ξηρό (ALLCE), Κρεμμύδι φρέσκο (ALLFI), Σκόρδο (ALLSA), Πράσο (ALLPO), Σχοινόπρασο (ALLSC), Ασκαλώνιο (ALLAS), Ραπανάκι (RAPSR), Καρότο (DAUCA).
Αρωματικά & Φαρμακευτικά φυτά: Άνηθος (AFEGR), Αρώνια (ABOSS), Βασιλικός (OCIBA), Γιασεμί (IASSS), Γλυκάνισος (PIMAN), Δυόσμος (MENSP), Δάφνη (LURSS/KAMSS), Δενδρολίβανο (RMSOF), Δίκταμο (DCMAL), Εστραγκόν (ARTDR), Θυμάρι (THYSS), Κάππαρη (CAPSS), Κορίανδρος

(CORSS/CORSA), Κύμινο (CVUCY), Λεβάντα (LAVSS), Μαϊντανός (PARCR), Μάραθος (FOEVU), Μαντζουράνα (MAJHO), Μελισσόχορτο (MLSSS/MLSOF), Μέντα (MENSS), Ρίγανη (ORISS/ORIVU), Σάλβια (SALOF), Σέλινο (APUGD,APUGV), Σχινόπρασο (ALLSC), Ύσσωπος (HYSOF), Φασκόμηλο (SALSS), Χαμομήλι (ANTSS).

Καλλωπιστικά: Αζαλέα (RHOSI), Αλεξανδρινό (EPHPU), Αφρικανική Βιολέτα (SNPSS), Γαρυφαλλιά (DINCA), Γλαδίολος/Γυψοφίλη (GLASS), Ζέρμπερα (GEBSS), Κυκλάμινα (CYZSS), Μπιγόνια (BEGSS), Ντάλια (DAHNY), Ορτανσία (HYESS), Πελαργόνιο (PELSS), Πριμούλα (PRISS), Τουλίπα (TULSS), Τριανταφυλλιά (ROSSS), Σαμπούκος (SAMNI), Χρυσάνθεμα (CHYIN)

Φράουλα (FRAAN)

Καπνοσπορεία (NIOTA)

** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά των ακάρεων του γένους Eriophyes στην καλλιέργεια της ροδακινιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

*** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στη ροδιά, τη συκιά, το μαστιχόδεντρο, την ελιά και το σπαράγγι από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα και τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Όλες οι καλλιέργειες	Μη εφαρμόσιμο (Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής)

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: --

Εξαιτίας του τρόπου δράσης του, ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας των εντόμων στο ERADICOAT Max είναι εξαιρετικά απίθανος. Το ERADICOAT Max αποτελεί ένα εργαλείο στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών (IPM) και για τη διαχείριση ανάπτυξης ανθεκτικότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εναλλαγή με συμβατικά, χημικά, διασυστηματικά εντομοκτόνα και ακαρεοκτόνα.

Προληπτικά μέτρα για την προστασία των ωφέλιμων αρθροπόδων:

Το ERADICOAT Max μπορεί να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις σε αρθρόποδα μη-στόχους που έρχονται σε επαφή με το ψεκαστικό διάλυμα. Σε θερμοκήπια που γίνεται εφαρμογή του ERADICOAT Max, η εξαπόλυση ωφέλιμων αρθροπόδων, να γίνεται μόνο μετά το στέγνωμα των φύλλων

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τη φυλλική επιφάνεια.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Γενικά δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.
Συνιστάται πριν τον ψεκασμό να γίνει δοκιμή σε μερικά φυτά. Αποφύγετε τον απευθείας ψεκασμό στα άνθη των καλλωπιστικών ειδών.
Ένα κολλώδες υπόλειμμα μπορεί να παρατηρηθεί στους καρπούς ή στο φύλλωμα των λαχανικών.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS05



GHS07

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει 2-methylisothiazol-3(2H)-one και 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+ P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270 Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε εκφενώματα.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος».

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια».

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe3 Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους, να αφήσετε απέκαστη μία ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη

SPe8 **Επικίνδυνο για τις μέλισσες.** Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκάστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

1. Η τιμολόγηση του σκευάσματος με την παλιά ετικέτα επιτρέπεται μέχρι 29/09/2025.
2. Η τελική διάθεση, αποθήκευση και χρήση από τους γεωργούς του σκευάσματος, με την παλιά ετικέτα επιτρέπεται μέχρι 28/02/2026.
3. Όσο αφορά τις ποσότητες του σκευάσματος που ήδη υπάρχουν στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά τις 28/02/2026, ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, για να ενημερώσει για την νέα άδεια τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων που έχουν ήδη προμηθευτεί το σκεύασμα. Νοείται ότι, όσα ΦΠ παρασκευάστηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υπογραφής της νέας άδειας θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νέα άδεια.
4. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021

Ημερομηνία: 29/08/2025



Κωνσταντής Σπανιάσης
για Διευθυντή
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα