

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ:	
Ολικό Άζωτο (N)	8 % β/β
Οργανικό Άζωτο (N)	4 % β/β
Άζωτο Αμυντίου (N)	4 % β/β
Ελεύθερη Αμινοξέα	14 % β/β
Οργανική Υλη	50 % β/β

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1,24 kg ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 L

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το CRUCERO είναι ένας βιοδιεγερτής που δίνει άμεσα ενέργεια στα φυτά, με μεγάλη ποσότητα ελεύθερων L-αμινοξέων και πεπτιδικών αλυσίδων που προκύπτουν από τη ζύμωση οργανικών ουσιών. Δημιουργούνται κατά την ζύμωση μοναδικές ενώσεις μεταξύ των ποιοτικών πρώτων υλών και των ουσιών που αποτελεύθερωνται κατά τη διαδικασία της ζύμωσης, που με την εφαρμογή τους στα φυτά, απελευθερώνουν και παρέχουν άμεσα αυξημένη ενέργεια για τα φυτά, βοηθώντας τα να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν όλες τις συνθήκες στρεσ, διεγέρνοντας έτσι τη βλαστική ανάπτυξη των καλλιεργειών. Το CRUCERO με τεράστια ποσότητα L-αμινοξέων και άζωτο ταχείας απορρόφησης, προωθεί την αύξηση και ανάπτυξη των φυτών. Επίσης συγκρατεί μαζί του και παρασύρει μέσα στο φυτό τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους, με αποτέλεσμα να αυξάνει την απορρόφηση των άλλων θρεπτικών ουσιστικών από τα φυτά, να προστατεύει ή/και επιπλαχνεί την ανάκαμψη της καλλιέργειας μετά από στρεσογόνες καταστάσεις και να αυξάνει την απόδοση και την ποιότητα των καλλιεργειών.

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ:

ATLANTICA AGRICOLA S.A.

C/ Corredera 33, Entlo
03400 Villena - Alicante - Spain
Tlf: 965800358 - 965800412 FAX: 965800323
e-mail: info@atlanticaagricola.com
http://www.atlanticaagricola.com

Αρ. Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας.
Ημερομηνία Παραγωγής: Βλέπε επί της συσκευασίας.
Ημερομηνία Λήξης: 3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P102 Μακριά από παιδιά.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.



Crucero

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



L.Lambrou Agro Ltd

Κεντρικά Γραφεία - Αποθήκες:
Οθέλλου 11, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου
2540, Δάλι, Λευκωσία - Κύπρος
Ταχ. Διεύθυνση: P.O.Box: 24839
1304 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: 22667938, **Fax:** 22667157
email: info@lambrouagro.com.cy
www.lambrouagro.com.cy

Ανακινεύεστε πριν τη χρήση

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμόζεται πάντα διαλυμένο σε νερό με διαφυλλικό τρόπο ή με λίπανση. Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ -5 και 35 °C.

ΔΟΣΕΙΣ:

Καλλιέργειες	Λίπανση * Ισεκ	Διαφυλλική εφαρμογή cc/100 L
Εσπεριδοειδή και οπωροφόρα	1-1.5	400-700
Κηπευτικά και πατάτα	0.6-1	300-500
Υδροπονία	0.4-0.5	300-500
Σιτηρά και Φυτά μεγάλης καλλιέργειας	-	200-400 / ΔΕΚΑΡΙΟ
Καλλωπιστικά	0.2-0.4	300-400

* Δόσεις ανά εφαρμογή.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ:

Μπορεί να αναμιχθεί με τα φυποπροστατευτικά προϊόντα και λιπάσματα που χρησιμοποιούνται συνήθως στη γεωργία, εκτός από προϊόντα που βασίζονται σε ορυκτέλαια, θείο, χαλκό ή οποιοδήποτε άλλο εξαιρετικά ολκαλικό ή δόνιο προϊόν. Οι εφαρμογές σε δαμασκηνής πρέπει να γίνονται με εξαιρετική προσοχή γιατί τα αμινοξέα μπορούν να ενισχύσουν τη φυτοτοξικότητα σε ευαίσθητες ποικιλίες. Σε κάθε περίπτωση, συνιστούμε τη διενέργεια δοκιμών συμβατότητας πριν από την εφαρμογή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ:

Οι δόσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ένδειξη και εναπότελεσμα στον χρήστη η μείωση/αύξηση ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης και τον τύπο της καλλιέργειας. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται η εφαρμογή υπό γεωπόνο ή υπό τεχνική επίβλεψη. Η ευθύνη του κατασκευαστή και του διανομέα περιορίζεται στην παράδοση του προϊόντος ή τη στιγμή της πώλησης, σύμφωνα με τη σύνθεση που αναγράφεται στην αρχική ετικέτα. Επομένως, ο κατασκευαστής και ο διανομέας δεν ευθύνονται για την ακατάλληλη χρήση, τον συνδυασμό με άλλα προϊόντα, τις επιπτώσεις αβιοτικών παραγόντων, την ευαίσθηση της ποικιλίας ή τη μεθόδο καλλιέργειας που χρησιμοποιείται.