

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

EUH208 Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P102 Μακριά από παιδιά. **P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **SP1** Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθοστρωτές επιφάνειες και τους δρόμους. Φοράτε γάντια και φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στον θερμοκήπιο μετά τον ψεκασμό οι εργάτες πρέπει να φοράνε γάντια και φόρμα εργασίας.

SPe1 Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά, χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε γλάστρες ή δοχεία ή δίσκους απορράς και εγκαταστήστε σύστημα συλλογής περίσσειου νερού από στράγγιση.

SPe8 **Επικίνδυνο για τις μέλισσες.** Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες που βρίσκονται στο στάδιο της ανθοφορίας, κατά την διάρκεια που τα θερμοκήπια είναι εν μέρη ανοιχτά.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 1401

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Να φυλάσσεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν: Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκκεριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής. Επειδή δεν έχουν δοκιμαστεί όλες οι ποικιλίες και ειδικά εκείνες που έχουν εισαχθεί πρόσφατα, κάντε πρώτα μια δοκιμή σε μικρή κλίμακα, πριν από τη χρήση του σκευάσματος σε μεγαλύτερο αριθμό φυτών.

Συνδυαστικότητα: Το σκεύασμα εφαρμόζεται μόνο του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1Lt

Ημερ. παραγωγής / Αρ. παρτίδας: βλέπε επι της συσκευασίας

PRETENDER

Συμπικνωμένο εναιώρημα (SC)

Αρ. άδειας: 3646

Εγγυημένη σύνθεση: Paclobutrazol: 0,4% B/o,
Βοηθητικές ουσίες: 99,59 % β/β

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κατηγορία και Τρόπος Δράσης: Ρυθμιστή ανάπτυξης για χρήση σε καλλωπιστικά φυτά που καλλιεργούνται σε γλάστρες ή δοχεία ή δίσκους απορράς σε θερμοκήπιο. Απορροφάτε από το φύλλωμα και από τις ρίζες των φυτών. Δρα παρεμποδίζοντας την σύνθεση βιββερίλλης, με αποτέλεσμα να παράγονται πιο ομοιόμορφα, συμπαγή και ανθεκτικά φυτά. Βελτιώνει την ανθοφορία, τη διάρκεια της και το χρώμα των ανθών. Συνιστάται η χρήση του σε αζαλέες, βεγόνιες, βιολέτες, πελαργόνια, γεράνια, καλαγχόη, πανσέδες, πετιούνιες, Αλεξανδρινό (ειδή Poinsettia), τριαντάφυλλα και τριαντάφυλλα μίνι καθώς και στα είδη: Ageratum, Cineraria, Impatiens, Lobelia.

Τρόπος Εφαρμογής: Εφαρμόζεται με ψεκασμό φυλλώματος με πλήρη διαβροχή των φυτών και με διαβροχή του υποστρώματος πριν την μεταφύτευση των φυτών.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: Ανακινίστε καλά το σκεύασμα πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση κατά την διάρκεια της εφαρμογής.

Καθαρισμός ψεκαστικών: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκτηθεί: 1. Μην ξαναχρησιμοποιείτε το υπόστρωμα όπου έγινε εφαρμογή του σκευάσματος σε επόμενες καλλιέργειες. **2.** Η επαναλαμβανόμενη χρήση του PRETENDER μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπία Paclobutrazol γενονότυπ που μπορεί να επηρεάσει επόμενες καλλιέργειες. **3.** Οι εφαρμογές πρέπει να διεξάγονται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η ποσότητα του PRETENDER που συσσωρεύεται στο υπόστρωμα. **4.** Να αποφευχθεί το ξέπλυμα του σκευάσματος σε έδαφος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε επόμενες καλλιέργειες. **5.** Πιάνετε προσεκτικά τις γλάστρες, τα δοχεία και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα στα οποία έγινε εφαρμογή του σκευάσματος πριν τα επαναχρησιμοποιήσετε.

Διανομέας: L. Lambrou Agro Ltd

Οθέλλου 11, Βιομ. Περιοχή Ιδαίου, 2540 Δάλι,
Λευκωσία, Κύπρος. Τηλ.: +357 22667908, Φαξ: +357 22667157
info@lambrouagro.com.cy, www.lambrouagro.com.cy

Κάτοχος της άδειας – Παρασκευαστής: PROPLAN – Plant Protection Company, S.L.
C/ Valle del Roncal 12, 1º - 7, 28232 Las Rozas, Madrid, Ισπανία

PROPLAN
Plant Protection Company, S.L.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΚΑΛΙΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Αζαλέες σε γλάστρες: Για την παραγωγή συμπαγών φυτών, για πρωίμηση της ανθοφορίας και περιορισμό της υπερβολικής βλάστησης. Δόση: 250 κ.εκ./ 10 λίτρα ψεκ. υγρού. Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος με πλήρη διαβροχή των φυτών όταν οι βλαστοί είναι μήκους 4-5 εκ. Δόση: 15 κ.εκ./ 10 λίτρα ψεκ. υγρού. Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογή με διαβροχή του υποστρώματος πριν την μεταφύτευση. Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιερ. περίοδο: 1 εφαρμογή.

Βεγόνιες: Για την παραγωγή συμπαγών φυτών. Δόση: 12,5 κ.εκ./ 10 λίτρα ψεκ. υγρού. Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος με πλήρη διαβροχή των φυτών όταν φυτά έχουν ύψος 7-10 εκ. Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιερ. περίοδο: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες.

Καλαγχόη: Για την παραγωγή συμπαγών φυτών. Δόση: 12,5 κ.εκ./ 10 λίτρα ψεκ. υγρού. Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος με πλήρη διαβροχή των φυτών όταν τα φυτά έχουν ύψος 4 εκ. Ο ψεκασμός μπορεί να επαναληφθεί σε περίπτωση γρήγορης ανάπτυξης των φυτών μετά από 7-21 ημέρες. Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιερ. περίοδο: 3 εφαρμογές.

Αλεξανδρινό (Είδη Poinsettia): Για την παραγωγή συμπαγών φυτών, με σκούρο πράσινο φύλλωμα και βαθύτερο κόκκινο χρωματισμό των βράκτων φύλλων. Δόση: 12,5 κ.εκ./ 10 λίτρα ψεκ. υγρού. Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος με πλήρη διαβροχή των φυτών μετά το κόψιμο, όταν οι νέοι βλαστοί έχουν μήκος 3-5 εκ. Μπορεί να απαιτείται επανάληψη ψεκασμών μετά από 7 – 14 ημέρες. Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιερ. περίοδο: 4 εφαρμογές.

Τριαντάφυλλα και τριαντάφυλλα μίνι σε γλάστρες: Για την παραγωγή συμπαγών και εύρωστων φυτών. Δόση: 100 κ.εκ./ 10 λίτρα ψεκ. υγρού. Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος με πλήρη διαβροχή όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 5-10 εκ. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε τον ψεκασμό μετά από 14 ημέρες. Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιερ. περίοδο: 2 εφαρμογές.

Πελαργόνια: Για τον περιορισμό της υπερβολικής βλάστησης και την παραγωγή πιο ανθεκτικών φυτών. Δόση: 12,5 κ.εκ./ 10 λίτρα ψεκ. υγρού. Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος με πλήρη διαβροχή των φυτών ξεκινώντας 2-3 εβδομάδες μετά τη φύτευση, όταν οι νέοι βλαστοί έχουν μήκος 4-5 εκ. και έως την αρχή της άνθησης. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε τον ψεκασμό μετά από 4 ημέρες. Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιερ. περίοδο: 2 εφαρμογές.

Βιολέτες: Για την παραγωγή συμπαγών φυτών. Δόση: 12,5 κ.εκ./ 10 λίτρα ψεκ. υγρού. Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος με πλήρη διαβροχή των φυτών ξεκινώντας 2-3 εβδομάδες μετά τη μεταφύτευση. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε τον ψεκασμό μετά από 4 ημέρες. Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιερ. περίοδο: 3 εφαρμογές.

Φυτά προς φύτευση: Γεράνια, Πανσέδες, Πετιούνιες, καθώς και στα είδη: Ageratum, Cineraria, Impatiens, Lobelia Για τον περιορισμό υπερβολικής βλάστησης και την παραγωγή πιο ανθεκτικών φυτών. Δόση: 12,5 κ.εκ./ 10 λίτρα ψεκ. υγρού. Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος με πλήρη διαβροχή των φυτών ξεκινώντας 2 εβδομάδες μετά το φύτευμα όταν τα φυτά έχουν αναπτύξει βλαστούς. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε τον ψεκασμό μετά από 7-14 ημέρες. Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιερ. περίοδο: 4 εφαρμογές.

Παρατηρήσεις: 1. Η αποτελεσματικότητα του PRETENDER μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το είδος, το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και τις τοπικές συνθήκες περιβάλλοντος. 2. Για εφαρμογές σε ανάμικτα είδη φυτών μπορεί να μην επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα σε όλα τα φυτά, λόγω διαφορικής ανατομικής του κάθε είδους. 3. Έχει δοκιμαστεί στις ποικιλίες: Diamond Red & Red Wing (Αζαλέες), Begonia Rossa & Begonia Gialla (Βεγόνιες), White (Καλαγχόη), Mira Red & Early Mars (Αλεξανδρινό, είδη Poinsettia), Lady's blush, Gypsy Sunblaze & Red Sunblaze (Τριαντάφυλλα), Ville De Paris (Πελαργόνια), Deep orange Fancy & Singing the Blues (Βιολέτες). 4. Μπορεί να χρειαστεί να αυξηθεί η ή μετωπή ή δόση, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες περιβάλλοντος. 5. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτείται επανάληψη εφαρμογών για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 6. Για καλύτερη αποτελεσματικότητα, συνιστάται η εφαρμογή του PRETENDER να γίνεται όταν επικρατεί συννεφιασμένος καιρός και όταν η σχετική υγρασία στο θερμοκήπιο δεν είναι πολύ υψηλή. 7. Τα φύλλα πρέπει να είναι στεγνά κατά την εφαρμογή του σκευάσματος. 8. Εφαρμόζεται σε ποτισμένο φυτά, αποφεύγοντας την εφαρμογή σε συνθήκες στρες. 9. Αποφύγετε το πότισμα στο φύλλωμα για 24 ώρες μετά την εφαρμογή.

Ψεκασμό φυλλώματος - απαιτούμενος όγκος ψεκαστικού υγρού:

Αζαλέες σε γλάστρες: 1,5 λίτρα ψ. υ. ανά 10 τ.μ. **Τριαντάφυλλα και τριαντάφυλλα μίνι σε γλάστρες:** 1,8 λίτρα ψ. υ. ανά 10 τ.μ. **Υπόλοιπα φυτά:** 2 λίτρα ψ. υ. ανά 10 τ.μ. ή την απαιτούμενη ποσότητα ψ. υ. ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης διαβροχή των φυτών, αποφεύγοντας την απορροή.

Εφαρμογή με διαβροχή του υποστρώματος - απαιτούμενος όγκος υγρού: Το υπόστρωμα πρέπει να είναι υγρό κατά το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος, ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη κατανομή του σκευάσματος. Ο απαιτούμενος όγκος νερού εξαρτάται από το μέγεθος της γλάστρας/δοχείου:

Διάμετρος γλάστρας

10 εκ.
15εκ.
20εκ.

Όγκος νερού/γλάστρα ή δοχείο

50 κ.εκ.
100 κ.εκ.
200κ.εκ.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Μην εφαρμόζομαι