



ΜΟΡΦΗ: ΑΒ - ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΟ ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΣΠΟΡΟΥΣ ΣΙΤΗΡΩΝ

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: bromadiolone 0,005% β/β.
Περιέχει τον πικραντικό-αποτρεπτικό παράγοντα denatonium benzoate Χρώμα: κόκκινο
Βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οργανισμοί – Στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης):
Rattus norvegicus (Καφέ Αρουραίος) - Νεαρά και Ενήλικα
Mus musculus (Οικιακό ποντίκι) - Νεαρά και Ενήλικα



International

Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης:
Διάρκεια ζωής προϊόντος: 24 μήνες. - Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.
Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως. - Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα. - Διατηρήστε το στην αρχική συσκευασία.

**RAT and
MOUSE
KILLER**

RODEX **WHOLE
WHEAT
BAIT**

Αρ. παρτίδας / Ημερ. παρασκευής: βλέπε επι της συσκευασίας

Διανομέας: L. Lambrou Agro Ltd
Οθέλλου 11, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου 2540,
Δάλι, Λευκωσία-Κύπρος
Τηλ.: +357 22 667 908, Fax.: +357 22 667 157
E: info@lambrouagro.com.cy, www.lambrouagro.com.cy

Κάτοχος της άδειας / Παρασκευαστής:
PelGar International Ltd Unit 13,
Newman Lane, Alton, Hants, GU34 2QR,
United Kingdom

Αρ. άδειας: KY-0023 ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα

20Kg



Πεδίο εφαρμογής: Οικιακοί ποτιστικοί και/ή αρουραίοι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι-περιμετρικά κτηρίων
Μέθοδος εφαρμογής: Δολωματική εφαρμογή. Ετοιμοχρηστό δόλωμα για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (tamper-resistant) ή σε προφυλαγμένα σημεία δόλωσης. Στους εξωτερικούς χώρους-περιμετρικά κτηρίων μπορεί να εφαρμοστεί και απευθείας στις στοές που δημιουργούν τα τρωκτικά.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής:

Ποτιστικοί: Μέχρι 40gr. δολώματος ανά σημείο δόλωσης.

Υψηλή προστασία: Μέχρι 40gr. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 2 μέτρα.

Χαμηλή προστασία: Μέχρι 40gr. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα.

Αρουραίοι: Μέχρι 200gr. δολώματος ανά σημείο δόλωσης.

Υψηλή προστασία: Μέχρι 200gr. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα.

Χαμηλή προστασία: Μέχρι 200gr. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 10 μέτρα.

Δόλωση σε στοές: 20-200gr. δολώματος ανά στοά.

Πεδίο εφαρμογής: Αρουραίοι – Υπόνομοι

Για χρήση σε υπόνομοι. Το δόλωμα τοποθετείται με τέτοιο τρόπο (στους υπόνομους) ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση από οργανισμούς μη-στόχους. Η επιφάνεια (πρόσβαση από οργανισμούς μη-στόχους) σε ένα συγκεκριμένο τόπο, εκτιμάται από την απόφαση για τη μέθοδο εγκατάστασης που χρησιμοποιήθηκε. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί τυχαία.

Μέθοδος εφαρμογής: Δολωματική εφαρμογή. Ετοιμοχρηστό δόλωμα που στερεώνεται ή τοποθετείται εντός δολωματικών σταθμών έτσι ώστε το δόλωμα να μην έρθει σε επαφή με τα λήματα.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής: Σε υπόνομους, τοποθετήστε ποσότητα έως 200gr. δολώματος ανά φρεάτιο εισόδου κάθε 30-50 μέτρα. Στερεώστε το δόλωμα σε διαθεσίμους κατασκευές για να διασφαλίσετε ότι δεν θα παρασυρθούν από το νερό. Ελέγχετε τακτικά την κατανάλωση των δολωμάτων από τα τρωκτικά και αντικαταστήστε τα φαινόμενα ή αλλοιωμένα δολώματα, μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση. Αναλάβετε την εφαρμογή σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις νέας προσβολής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης. - Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επίπονο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής. - Καθαρίστε το χώρο από πιθανές πηγές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμικοί σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την απόδοξη του δολώματος από τα τρωκτικά. - Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τρωκτικών (π.χ. να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης. - Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιών, σημεία τροφής, τρύπες, λαγυμιά, κ.λπ.). - Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο εδάφος ή σε άλλες κατασκευές. - Ο δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται. - Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή με τρωκτοκτόνα θα πρέπει να επισημειώνονται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και τα μέτρα πρώτων βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης. - Το δόλωμα θα πρέπει να ασφαλιζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού. - Τοποθετείτε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη-στόχοι. - Τοποθετείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά. - Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος (γάντια για προστασία από χημικά (EN374)). - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σας και τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος αμέσως μετά τη χρήση του. - Η συχνότητα επίσκεψης στις περιοχές εφαρμογής δολωμάτων, εξαρτάται από τον χειριστή, υπό το πρίσμα της έρευνας που έγινε κατά την έναρξη της καταπολέμησης. Η συχνότητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνα με τις συνστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής. - Εάν η πρόληψη του δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σύγκριση με το μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση. - Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί. Όταν έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανό τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγιδιών, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου. - Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση ανθεκτικότητας του πληθυσμού-στόχου, όταν επιλεγεί το τρωκτοκτόνο που θα χρησιμοποιηθεί. Στις περιοχές εκείνες που υπάρχουν ενδείξεις ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, αποφυγήτε την χρήση τους. Για το έλεγχο εξάπλωσης της ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή δολωμάτων που περιέχουν διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες. - Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 ή 3 ημέρες (στην περίπτωση των ποτιστικών) και κάθε 5 - 7 ημέρες (στην περίπτωση των αρουραίων) αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται αν τα δολώμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και για να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο. - Απομακρύνετε υπόλοιπο προϊόντος όταν λήξει η

περίοδος καταπολέμησης των τρωκτικών. - Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημειώνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: "Α να μην μετακινείται και να μην ανοίγεται", "περιέχει τρωκτοκτόνο", "ονομαστικά προϊόντος ή αριθμός έγκρισης", "δραστική(-ές) ουσία(-ές)" και "σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων (Τηλεφωνικό κέντρο δηλητηριάσεων 1401)". - Δόλωση σε στοές τρωκτικών: Η τοποθέτηση των δολωμάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε είδη μη-στόχους και στα παιδιά. Καλύψτε ή φράξτε τις εισόδους των δολωμένων στοών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης και έκχυσης των δολωμάτων.

Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου

- Τα δολώματα πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο που να μην έρχονται σε επαφή με το νερό και να μην ξεπλένονται. - Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, χυχοί νερού, γαϊτάνια, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό. - Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους ότι θα γίνει εφαρμογή στην καταπολέμηση τρωκτικών (σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει). - Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλ. η ετικέτα και/ή φυλλάδια) να αναφέρονται με σαφήνεια ότι το προϊόν θα παρέχεται μόνο σε "Συνεργεία Εκτέλεσης Επαγγελματικών Έργων/Εφαρμογής Βιοκτόνων" που έχουν άδεια από την Αρμόδια Αρχή. - Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ανθεκτικότητας στην δραστική ουσία. - Τα προϊόντα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής. - Για λόγους διαχείρισης της ανθεκτικότητας, μην εναλλάσσεται τα αντιπηκτικά σκευάσματα με άλλα αντιπηκτικά παρόμοια ή χαμηλότερης ισχύος. Για εναλλαγή χρήσης με άλλα τρωκτοκτόνα, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μη αντιπηκτικό τρωκτοκτόνο, εάν υπάρχει, ή ένα ισχυρότερο αντιπηκτικό τρωκτοκτόνο. - Μετάς των εφαρμογών, μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σφύρα που χρησιμοποιείτε σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία τοποθέτησης δολωμάτων. - Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. - Δόλωση σε στοές - Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους ότι θα γίνει εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών (σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει). - Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (π.χ. καλύψτε τις σπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές και νερό όσο πιο μακριά γίνεται) ώστε να βελτιώσετε τη λήψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών. - Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά από τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της καταπολέμησης, σύμφωνα με τις συνστάσεις που δίνονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής. - Μην χρησιμοποιείται το προϊόν ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη τρωκτικών από τρωκτικά ή παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

Οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Κατά τα τέλος της περιόδου καταπολέμησης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Συνιστάται η χρήση γαντιών.

Άλλες πληροφορίες

- Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτοκτόνων, μπορεί να χρειαστούν 4 έως 10 ημέρες από την έναρξη του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα. - Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγνοείτε νεκρά τρωκτικά με ψυμνά γέφυρα, κατά την απόρριψή τους χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες. - Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H360D Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο έμβryo.

H372 Προκαλεί βλάβη στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P201 Εφοδιάστε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. **P202** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. **P260** Μην αναπνέετε σκόνη. **P264** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. **P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

P308+P313 Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. **P314** Συμβουλευθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο. **P501** Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος
- Αυτό το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάσπασης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινorrhογία και αιμορραγία στα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.

- **Αντιόδοτο: Βιταμίνη Κ1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.**

Σε περίπτωση:

- Δερματικής έκθεσης, ξεπλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.
 - Οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υψρό έκλυσης ματιών ή σέκετο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
 - Στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προεκτικά με νερό. Ποτέ μη χορηγήσετε οπίσθοις από το στόμα ή αναίσιθο άτομο.
- Μην προκαλείτε έμετο. Σε περίπτωση κατάσπασης, γυρίστε αμέσως ιατρικό συμβούλιο και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Σε περίπτωση κατάσπασης από κατοικίδια ζώα, επικοινωνήστε με κτηνίατρο. - Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

RODEX WHOLE LIFE BAIT