

LARVIGEN®

ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΟ - ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΟ - ΟΩΟΚΤΟΝΟ



MAX SC



ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ
ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΟ - ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΟ - ΟΩΟΚΤΟΝΟ
ΓΙΑ ΖΩΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



1L

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (L)



Αριθμός παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: Βλέπε συσκευασία

Αρ. άδειας: Β1973
Συμπύκνωμα εναιωρήματος (SC)

ΣΥΝΘΕΣΗ:
Cypermethrin 5%
Diflubenzuron 3 %

Αδειοδοτημένες χρήσεις: Ερασιτεχνική, Επαγγελματική

Χαρακτηριστικά: Το LARVIGEN® MAX SC είναι εντομοκτόνο (προνυμφοκτόνο, ακμαιοκτόνο και ωοκτόνο) ευρέως φάσματος δράσης σε μορφή SC (συμπυκνωμένο εναιωρήματος). Η σύνθεσή του δρα τόσο σε ενήλικα έντομα (cypermethrin) όσο και σε προνυμφές και αυγά (diflubenzuron). Η δράση του LARVIGEN® MAX SC στα παράσιτα παραμένει με την πάροδο του χρόνου, καθώς αποτρέπει την ολοκλήρωση του βιολογικού κύκλου των εντόμων. Αναστέλλει την ανάπτυξη των προνυμφών, αποτρέπει την εκκόλαψη των αυγών και επιτυγχάνει έτσι την εξάλειψή των ενηλίκων. Δρα με επαφή και κατάποση σε διάφορα έντομα και ακάρεα που συνήθως περιβάλλουν τα ζώα (ψύλλοι, ψείρες, κουνούπια, σκαθάρια, μύγες, καταραρίδες, ακάρεα κ.λπ.).

Ενδείξεις: Το LARVIGEN® MAX SC είναι εντομοκτόνο για χρήση από επαγγελματίες χρήστες, σε εγκαταστάσεις με ζώα και πτηνά (κοτόπουλα, χοίροι, αιγοπρόβατα, βοοειδή, κατσίκες, κουνέλια κ.λπ.), κατοικίδια, ζωολογικούς κήπους, οχήματα μεταφοράς ζώων κ.α.

Οδηγίες χρήσης: Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, αφαιρέστε τυχόν οργανικά απόβλητα (κόπρωνα, ούρα) από τις περιοχές που πρόκειται να γίνει εφαρμογή. Εφαρμόστε το LARVIGEN® MAX SC απευθείας στις επιφάνειες όπου τα έντομα συχνάζουν, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που περνούν, πλαίσια παραθύρων, τοίχους, τους σωλήνες νερού και άλλους αγωγούς.

Δόσεις: Αραιώστε 10ml του προϊόντος σε 1L νερού, ανακινώντας έντονα κάθε φορά που γίνεται η εφαρμογή (το διάλυμα μετά την αραίωση πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως και όχι περισσότερο από 24 ώρες μετά την παρασκευή του). Μόλις αραιωθεί, εφαρμόστε το προϊόν μέσω ψεκασμού με δόση 1L του διαλύματος ανά 10 m² σε μη πορωδείς και απαλλαγμένες από οργανικές ύλες επιφάνειες. Σε περίπτωση μεγάλων προσβολών, πορωδών επιφανειών ή υπολειμμάτων οργανικής ύλης, συνιστάται να διπλασιάσετε τη δόση.

Προφυλάξεις: Αποφύγετε να εργάζεστε στο σύννεφο ψεκασμού. Εκτελέστε την εφαρμογή στην απουσία ζώων. Αερίστε την περιοχή εφαρμογής πολύ πριν από την επανείσοδο. Μπορείτε να επαναφέρετε τα ζώα 8 ώρες μετά την εφαρμογή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση εντός 2 ετών από την ημερομηνία παραγωγής. Μετά από αυτό το διάστημα, το προϊόν μπορεί σταδιακά να υποστεί μείωση της αποτελεσματικότητάς του. Προστατέψτε την έκθεση του προϊόντος στο άμεσο ηλιακό φως, την υγρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες. Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά δοχεία πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις δηλωμένες προφυλάξεις και επικινδυνότητες του σκευασματος, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και μέσω εξουσιοδοτημένων διαχειριστών αποβλήτων.

Δηλώσεις επικινδυνότητας: H319: Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών. H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH208: Περιέχει 1, 2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης: P102: Κρατήστε το μακριά από παιδιά. P280+P264: Φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ρούχα, προστασία ματιών και προστασία προσώπου. Πλύνετε καλά τα χέρια, το πρόσωπο και τα χέρια μετά το χειρισμό. P273: Αποφύγετε την απελευθέρωση του στο περιβάλλον. P391: Μαζέψτε τη χυμνή ποσότητα. P501: Απορρίψτε το περιεχόμενο / δοχεία σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα επικινδύνα υπολείμματα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ Ή ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Βασικά μέτρα δράσης: Σε τυχόν επαφή με τα μάτια, πλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής. Σε τυχόν επαφή με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι, χωρίς να το τρίψετε. Εάν είναι απαραίτητο, μεταφέρετε το μολυσμένο άτομο σε νοσοκομείο και δείξτε την ετικέτα ή τη συσκευασία.

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Η δηλητηρίαση μπορεί να προκαλέσει: Ερεθισμό των ματιών και του δέρματος.

Θεραπευτικές συμβουλές για ιατρούς και επαγγελματίες υγείας: Συμπτωματική θεραπεία.

ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ Η ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

Κάτοχος Εγγραφής: Bioplagen S.L.
Avda. Castilleja de la Cuesta, 26 (PIBO)
41100-Bollullos de la Mitación (Sevilla), Spain.
Telephone No.: 955 77 65 77 | Fax: 955 77 65 66
bioplagen@bioplagen.com | www.bioplagen.com

Διανομέας Κύπρου: L.Lambrou Agro Ltd
Οθέλλου 11, 2540 Δάλι, Λευκωσία
Τηλ. 22667908, Φαξ 22667157
info@lambrouagro.com.cy
www.lambrouagro.com.cy



ΠΡΟΣΟΧΗ

