

DARAMUN 10SC

Η ΣΙΓΟΥΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΠΛΕΝΕΤΑΙ



Δραστική ουσία: cyazofamid 10% β/ο
Ομάδα Τρόπου Δράσης: 21
Αριθμός Άδειας: 3900



*Υγρό μυκητοκτόνο επαφής για τον έλεγχο του
Περονοσπόρου σε Αμπέλι, Ντομάτα και Πατάτα*

ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ

- Υψηλή αποτελεσματικότητα στους Περονόσπορους (*Plasmopara*, *Phytophthora*)
- Προληπτική δράση μεγάλης διάρκειας (εφαρμόζεται πριν την έναρξη της προσβολής)
- Ελέγχει όλα τα στάδια της ασθένειας (ζωοσπόρια, μυκήλιο, ωοσπόρια)
- Συνδυάζεται χωρίς πρόβλημα σχεδόν με όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
- Δεν επηρεάζει τους ζυμομύκητες και άλλους ωφέλιμους μικροοργανισμούς
- Η επιφανειοδραστική ουσία που περιέχει, σε μορφή οργανο-σιλικόνης, διασφαλίζει την καλύτερη προσκόλληση του σκευάσματος πάνω στην φυλλική επιφάνεια και μεγαλύτερη αντοχή στο ξέπλυμα από βροχή και πότισμα

DARAMUN 10SC | ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΚΟΛΗΣΗ ΣΕ ΚΗΡΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΥΣΗ
Η αποτελεσματικότητα παραμένει υψηλή ακόμη και μετά από έντονη βροχόπτωση (40, 60, 100 mm ύψους βροχής), αμέσως μετά την εφαρμογή.

ΓΙΑΤΙ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ

Η δράση του cyazfamid ενισχύεται με την οργανο-σιλικόνη, την επιφανειοδραστική ουσία που περιέχεται στην σύνθεση.



ΧΩΡΙΣ
επιφανειοδραστικά πρόσθετα



ΜΕ
επιφανειοδραστικά πρόσθετα




ΜΕΤΑ
επιφανειοδραστικά του **DARAMUN 10SC**

DARAMUN 10SC | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ




ΝΤΟΜΑΤΑ

DARAMUN 10SC:
80 ml/δεκ.
2-3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΙΣ 6 ΚΑΘΕ 7-10 ΜΕΡΕΣ



ΠΑΤΑΤΑ

DARAMUN 10SC:
80 ml/δεκ.
2-3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΙΣ 6 ΚΑΘΕ 5-7 ΜΕΡΕΣ (ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕ 10 ΜΕΡΕΣ ΟΤΑΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΕΝ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ)



ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
Αμπέλι: 21 μέρες | Πατάτα: 7 μέρες | Ντομάτα: 3 μέρες

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο.
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.