

Belure T

ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG) TRIBENURON-METHYL

**ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΑ**

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Εγγυημένη σύνθεση:

Tribenuron-methyl 75% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 21,8% β/β

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 3476

ΠΡΟΣΟΧΗ



Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει tribenuron-methyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Εφοδιαστείτε με ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/σταγονίδια/εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα απομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προστεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σπασούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. **Σε περίπτωση ειστονής:** Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΩΝ: 1401.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

- Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε το BELURE-T σε αλκαλικά εδάφη (pH>7) περισσότερο από μία φορά κάθε 3 χρόνια για εαρινές εφαρμογές σε χειμερινά σητηρά.
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
- Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αιφέαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό τίεστη ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσμιο, για τη διασφάλιση της μη περιαρπάτησης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκεύασματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο έργου, δροσερό, και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες < 35°C παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφουνολουριών για την καταπολέμηση πλαταύφυλλων ζιζανίων σε Σιτάρι (μαλακό και σκληρό) και Κριθάρι. Δρα διασυστηματικά, απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και δευτερεύοντας από τη ρίζα των ζιζανίων, μετακινείται στα ακραία μεριστώματα, βλαστού και ρίζας και εμποδίζει την ανάπτυξή τους. Δρα ως παρεμποδιστής του ενζύμου συνθετάσης του οξικογαλακτικού (ALS) με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βιοσύνθεσης των αμινοξέων.

Καλλιέργειες – Ασθένειες – Δόσεις – Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής: Χειμερινά Σιτηρά (Κριθάρι, Σιτάρι, Τριτικάλε): Για Ετήσια πλαταύφυλλα ζιζανία δόση 2 γρ. σκ./δεκάριο. Όγκος ωρ. υγρού 10-50 λίτρα/δεκ. Μεταφυτρωτική εφαρμογή μετά τα 9 φύλλα της καλλιέργειας και μέχρι το τέλος του αιδελφώματος. Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλιέργητη περίοδο: 1 εφαρμογή.

Παρατηρήσεις: Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο των 2 έως 6 φύλλων.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Πολύ ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριο σινάπι, Άγριο χαμομήλι, Καψέλλα, Λάμιο, Στελλάρια. Ευαίσθητα ζιζάνια: Κίρσιο, Κολλητίδια, Παπαρούνα.

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Χαμομήλι, Πολυκόμπη.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το φ.π. μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλείστε: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: Tribenuron-methyl: B.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό ή να γίνεται εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με μπεκ τύπου σκούπας με πίεση μικρότερη από 2,7 ατμόσφαιρες (40 psi) και υπό συνεχή ανάδευση με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 10-50 λίτρα ψεκαστικού υγρού στο δεκάριο.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση σκευασμάτος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Πραγματοποιήστε τον ψεκασμό υπό συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα ως εξής:

- Αδειάστε τελείως το βυτίο.
- Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό) και αδειάστε το ξανά.
- Μίσογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, προσθέστε διάλυμα 1/3 λίτρο οικιακή αμμωνία (περιεκτικότητας 9,5%) για κάθε 100 λίτρα νερό και απογεμίστε με καθαρό νερό.
- Γεμίστε όλα τα μέρη του ψεκαστικού, αφήστε να κυκλοφορήσει το διάλυμα μέσω των σωληνώσεων για τουλάχιστον 15 λεπτά με συνεχή ανάδευση και αδειάστε τελείως.
- Για να αφαιρεθούν όλα τα ίχνη του διαλύματος, ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με άφθονο καθαρό νερό.
- Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά σε διάλυμα αμμωνίας ίδιας συγκέντρωσης τα μπεκ και τα φίλτρα.
- Το ψεκαστικό να μην ξεπλένεται σε έδαφος που καλλιεργείται ή πρόκειται να καλλιεργηθεί.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Χειμερινά Σιτηρά:

Μη εφαρμόσιμο (Μ.Ε.)

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιέργειών που ακολουθούν: Μη σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από σιτηρά, λινάρι, τριφύλλι, ελαιοκράμβη, κουκιά, μπιζέλια, πατάτες, πριν περάσουν 90 μέρες από την εφαρμογή του. Σε περίπτωση αποτυχίας, να σπέρνετε μόνο σιτηρά το ίδιο χρόνο.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Κάτοχος της έγκρισης:

Probelte, S.A.U.
C/ Antonio Belmonte Abellán, 3-5
30100 - Murcia - Spain
probeite.com

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομέας:
L. Lambrou Agro Ltd,
Οθέλλου 11, Βιού. Περιοχή Ιδαίου,
2540 Δάλι, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22667908, Φαξ: +357 22667157
Email: info@lambrouagro.com.cy