



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 5037 (Έντυπο 08), για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος CASINO ROYALE ως ακολούθως:

Α) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

4037

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

31/01/2025

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/09/2026

2. Κάτοχος της άδειας:

Sharda Cropchem España S.L.

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L. Lambrou Agro Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. Lambrou Agro Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Casino Royale

2. Μορφή: Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι (WG)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

boscalid 26,7% β/β
pyraclostrobin 6,7% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 65,6% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

SHARDA CROP CHEM LIMITED, Ινδία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. Solfotecnica Italiana (S.P.A.), Ιταλία
2. ChemSol BZ, Ιταλία
3. Zhejiang Bosst Cropscience Co., Ltd., Κίνα

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. Solfotecnica Italiana (S.P.A.), Ιταλία
2. ChemSol BZ, Ιταλία
3. Zhejiang Bosst Cropscience Co., Ltd., Κίνα
4. SMB Formulation, Γαλλία
5. Zhenjiang Pioneer Cropscience Co., Ltd., Κίνα
6. JIANGSU REPONT AGROCHEMICAL CO., LTD., Κίνα
7. Taizhou Bailly Chemical Co., Ltd, Κίνα
8. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Ελλάδα
9. ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ, Ελλάδα
10. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε., Ελλάδα
11. ΑΓΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ, Ελλάδα
12. ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε., Ελλάδα
13. Σ.Ε.Γ.Ε. Α.Β.Ε.Ε., Ελλάδα
14. ΗΕΛΛΑΦΑΡΜ, Ελλάδα
15. ΚΑΡΒΕΛΑΣ, Ελλάδα

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα μέσα σε κουτί	100 γρ., 200 γρ., 250 γρ., 500 γρ., 750 γρ., 1 κιλό	PE, Κουτί χάρτινο
2	Σακούλα/Σάκος	5, 10, 20 και 25 κιλά	PE
3	Φιάλη ή Δοχείο	150 γρ., 300 γρ., 500 γρ., 1 κιλό, 3 κιλά, 5 κιλά	HDPE

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

1. Boscalid
2. Pyraclostrobin

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

1. 97% β/β min
2. 97,5% β/β min

3. Παρασκευαστής των δ.ο.:

SHARDA CROP CHEM LIMITED, Ινδία

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.1:

Jingbo Agrochemicals Technology Co., Ltd., Κίνα

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.2:

Shanghai Heben-Eastsun Medicaments Co., Ltd., Κίνα

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Μυκητοκτόνο με προληπτική και κατά περίπτωση θεραπευτική δράση που παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση. Η δ.ο. pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Q_o του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποπλαστική και διελασματική κίνηση, ενώ η δ.ο. boscalid παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή αλλά σε διαφορετική θέση δράσης (σύμπλοκο II) και εμφανίζει διασυστηματική κίνηση.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες



ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο υπό ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ./δεκ. μέγιστη		
Τομάτα Υπαίθρου	Αλτερνάρια (<i>Alternaria</i> sp.)	50 - 100	150	Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών από την έναρξη σχηματισμού των πλευρικών βλαστών έως την εμφάνιση του τυπικού χρώματος στο 70% των καρπών. BBCH 20-87	3 / 8-10 ημέρες
Μελιτζάνα Υπαίθρου	Ωίδιο (<i>Oidium</i> sp.)	50 - 100	150	Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών από την έναρξη σχηματισμού των πλευρικών βλαστών έως την εμφάνιση του τυπικού χρώματος στο 70% των καρπών. BBCH 20-87	3 / 8-10 ημέρες

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Τομάτα, Μελιτζάνα	3 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης - FRAC: boscalid: 7 / pyraclostrobin: 11

- Συνιστάται να μην χρησιμοποιείται το σκεύασμα για περισσότερες από 2 συνεχόμενες εφαρμογές. Πριν την 3η εφαρμογή, χρησιμοποιείτε μια δραστική ουσία με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Συνιστάται η εφαρμογή του σκευάσματος προληπτικά ή στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των ασθενειών. Αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόσθηκε το σκεύασμα, το ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί μετά από ένα (1) χρόνο.

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Μην σπείρετε την επόμενη καλλιέργεια πριν περάσει ένας (1) χρόνος από την εφαρμογή του σκευάσματος.

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Να μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

--

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS079

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405 + P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P273: Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον.

P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμειξη/φόρτωση και την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Sp1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα./ Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μια ασφένκη ζώνη προστασίας 20 μέτρων, εκ των οποίων τα 10 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης από τα επιφανειακά ύδατα.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικές πληροφορίες: Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε ψεκαστικό υγρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό, κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό ή μην δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σκίσιμο (φιάλες, σακούλες, κουτιά), για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία:04/07/2025.....



Σφραγίδα

Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας