



ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ



ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ

SULFOLAC 80WG

Μυκητοκτόνο - Ακαρεοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

Εγγυημένη σύνθεση: Sulphur 80% β/β, βοηθητικές ουσίες: 19,2 % β/β

Ομάδα τρόπου δράσης: FRAC: sulphur: M2

ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

Καταλληλότητα χρήσης του προϊόντος για τη Βιολογική Γεωργία (Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2018/848):

Η χρήση του επιτρέπεται στη Βιολογική Γεωργία.



Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Καθαρισμός Ψεκαστήρα: Αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δυο-τρεις (2-3) φορές με καθαρό νερό. Επειδή το θειάφι διαβρώνει τα μέταλλα, οι ψεκαστήρες πρέπει να πλένονται πολύ καλά αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Ελιά: 90 ημέρες, Ζαχαρότευτλα: Δεν ορίζεται, Λοιπές καλλιέργειες του φάσματος δράσης: — ημέρες.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Στην καλλιέργεια του αμπελιού να μην εφαρμόζεται πολύ κοντά στη συγκομιδή καθώς αφήνει σημάδια πάνω στους καρπούς. Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα τρόπου δράσης - FRAC: sulphur: M2

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μέσα σε 4 εβδομάδες από την εφαρμογή πολτού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα. Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 30 °C) μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα φυτά. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή, καθώς και σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς (όπως STARKING, DELICIOUS κ.α.), αχλαδιάς (όπως D'ANJOU κ.α.) και βερικοκιάς κάτω από συνθήκες υψηλής ηλιοφάνειας και υψηλών θερμοκρασιών.

Κάτοχος της άδειας: Agrostulln GmbH

Διανομέας: L. LAMBROU AGRO LTD

Οθέλλου 11, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, 2540 Δάλι, Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ.: +357 22667908 • www.lambrouagro.com.cy

agrostulln

Αριθμός Άδειας: 4194

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με παραφινικό λάδι καθώς και με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο και μακριά από εστίες φωτιάς. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σάκια, σάκοι) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή απόκτηση ενέργειας.

Δηλώσεις Προφύλαξης:

P102+P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. **P234** Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. **P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. «Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση» «Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μπότες κατά την εφαρμογή» «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια σε περίπτωση που εισέλθουν στον αγρό μετά την εφαρμογή». **SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του. **Spe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα. **SPe3** Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη ασφαλείας από ακαλλιέργητη γη: • **5 μέτρων** σε αμπέλια, τροπικά δένδρα, ελιές, λυκίσκο, καλλωπιστικά όταν η εφαρμογή γίνεται με συμβατικά ακροφύσια • **10 μέτρων** σε άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες και σε δασικά δένδρα λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή γίνεται με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%** ή **5 μέτρων** με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%** ή **3 μέτρων** με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **90%**. **EUH401** Για να αποφυγείτε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Ξεπλύνετε το στόμα. Μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλέσετε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

PE5101B / 25KG / 26.09.2025



25 KG

Lambrou
agro ltd
green is life

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής (Βλέπε πιο κάτω)	Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο / μεσοδιάστημα
		γρ. / δεκ.	γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)		
Εσπεριδοειδή	Άκαρι (<i>Eriophyes</i> sp.)	750	200-500	50-300	A	8/7 ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά	Οίδιο (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	600	400-500	100-150	B+B1	
	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>)		200-300		B+B2	
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά	Οίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)		300-400	50-150	Γ	
Φουντουκιά	Οίδιο (<i>Phyllactinia guttata</i>)	500	200-500	50-100	B	2/7 ημέρες
	Ακάρεα (<i>Eriophyes</i> sp., <i>Phytoptus avelanae</i>)				A	
Αμυγδαλιά	Οίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)			50-100	B	8/7 ημέρες
Ελιά (ποικιλία πράσινη ελιά Χαλκιδικής)	Ακάρεα της οικογένειας <i>Eriophyidae</i>	384	320	100-120	Δ	2/30 ημέρες
Λωτός, Αβοκάντο, Παπάγια, Μάγκο	Οίδιο	750	200-500	50-150	B	8/7 ημέρες
Αμπέλι (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες)	Οίδιο (<i>Uncinula necator</i>)	600	200-400	50-150	B+B4	8/10 ημέρες
		300	100-200		B+B5	
	Ερίνωση (<i>Eriophyes vitis</i>)	1500	1000		B+B6	
Φράουλα (Υ&Θ)	Οίδιο (<i>Sphaerotheca macularis</i> , <i>Podoshaera aphanis</i>)	500	-	50-100	B	8/10-14 ημέρες
	Άκαρι (<i>Eriophyes</i> sp., <i>Aculops lycopersici</i>)	500-750				6/14 ημέρες
Βατόμουρα, Σμέουρα, Μύρτιλλα	Οίδιο (<i>Sphaerotheca macularis</i> , <i>Podoshaera aphanis</i>)	500	-	50-100		8/7-10 ημέρες
Καρότα (Υ&Θ), Παντζάρι, Ραπάνια, Λαγόχορτο, Παστινάκι	Οίδιο (<i>Erysiphe</i> spp., <i>Oidium</i> spp.)	300-400	-	50-100		
Σκόρδο, Κρεμμύδι	Οίδιο (<i>Leveillula taurica</i>)		-	50-100		
Τομάτα (Υ&Θ), Μελιτζάνα (Υ&Θ), Πιπεριά (Υ&Θ)	Οίδιο (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium</i> spp., <i>Erysiphe cichoracearum</i>), Ακάρεα, Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>), <i>Eriophyes</i> sp., Παραμορφωτικό άκαρι (<i>Aculops lycopersici</i>)	300	-	50-100		8/7-15 ημέρες
Αγγούρι (Υ&Θ), Αγγουράκι (Υ&Θ), Κολοκυθάκι (Υ&Θ), Κολοκύθα (Υ&Θ), Πεπόνι (Υ&Θ), Καρπούζι (Υ&Θ)	Οίδιο (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> , <i>Podosphaera xanthii</i>)		-	50-100		
Λάχανο (Κραπί) (Υ&Θ), Κουνουπίδι (Υ&Θ), Μπρόκολο (Υ&Θ), Λαχανάκι Βρυξελλών (Υ&Θ)	Οίδιο (<i>Erysiphe</i> spp., <i>Sphaerotheca</i> spp.), Τετράνυχος (<i>Tetranychus</i> sp.)		-	50-100		8/7-10 ημέρες
Μαρούλι και λοιπά σαλατικά, Σπανάκι, Λυκοτρίβολο, Σκαρόλα, Κιχώριο, Αντίδι κατσαρό, Ραδίκι	Οίδιο (<i>Oidium</i> spp., <i>Erysiphe cichoracearum</i>), Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	400	-	50-100		
Φασόλια (φρέσκα με λοβό και χωρίς λοβό) (Υ&Θ)	Οίδιο (<i>Oidium</i> spp., <i>Erysiphe</i> spp.)	300-400	-	50-100		
Μπιζέλια (αρακάς) (φρέσκα με λοβό και χωρίς λοβό) (Υ&Θ)	Οίδιο (<i>Oidium</i> spp., <i>Erysiphe</i> spp.)		-	50-100		
Αγκινάρα	Οίδιο (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium</i> spp.), Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	500	-	50-100		
Φασόλια ξηρά (όσπρια)	Οίδιο (<i>Oidium</i> spp., <i>Erysiphe</i> spp.)	300-400	-	50-100		
Μπιζέλια ξηρά (αρακάς- ρεβίθι) (όσπρια)	Οίδιο (<i>Oidium</i> spp., <i>Erysiphe</i> spp.)		-	50-100		
Πατάτα	Οίδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	500	-	50-100		8/7 ημέρες
Ηλίανθος	Οίδιο (<i>Erysiphe</i> spp.)		-	50-100		2/7 ημέρες
Σόγια	Οίδιο (<i>Erysiphe</i> spp.)		-	60-100		2/14 ημέρες
Ζαχαρότευτλα	Οίδιο (<i>Erysiphe betae</i>)	750-1000	-	20-60	B	
	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	480	240-480	40-100	E	3
Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη	Οίδιο (<i>Erysiphe graminis</i>)	750-1000	-	20-60	Z	2/14 ημέρες
Λυκίσκος	Οίδιο (<i>Podosphaera macularis</i>), Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	750-1200	-	100-200	B	8/7 ημέρες
Καπνός	Οίδιο (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	400	-	50-100		
Καλλωπιστικά- Ανθοκομικά: Τριανταφυλλιά	Οίδιο (<i>Oidium</i> spp. <i>Sphaerotheca</i> spp., <i>Podosphaera pannosa</i>), Άκαρι (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i>)	300	200-300	50-100	H	
Δασικά δένδρα: Λεύκα (φυτώριο)	Οίδιο	500	-	50-100	B	3/7 ημέρες

Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής: **(Α)** Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων **(Β)** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας / της προσβολής **(Β1)** Πριν την άνθηση στα στάδια πράσινη και ρόδινη κορυφή **(Β2)** Μετά την άνθηση στην πτώση των πετάλων **(Β4)** Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκατ. **(Β5)** Κατά την άνθηση, μετά το δέσιμο των ραγών και κάθε 15-20 μέρες μέχρι το στάδιο του «γυαλίσματος» των ραγών ανάλογα πάντοτε με την ένταση της προσβολής **(Β6)** Λίγο πριν τη διόγκωση των οφθαλμών **(Γ)** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, στα στάδια πτώσης πετάλων, απόσπασης του κάλυκα και στο στάδιο καρπι- δίου **(Δ)** Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογή κατά το στάδιο σχηματισμού των ανθοφόρων οφθαλμών (Απρίλιο) & κατά την πτώση των πετάλων (τέλος ανθοφορίας) **(Ε)** Με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξη αυτής **(Ζ)** Συνήθως μία εφαρμογή όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα. Σε περίπτωση σοβαρής προσβολής του τελευταί- ου φύλλου, απαιτείται μία δεύτερη εφαρμογή στην αρχή του ξεσταχυσάματος **(Η)** Μόλις οι βλαστοί αποκτήσουν μήκος 10-15 εκατ. και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής **Παρατηρήσεις:** **(1)** Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού **(2)** Η δόση ανά 100 λίτρα να συνδυαστεί κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβαίνεται η μέγιστη επιτρεπτή δόση / δεκ. **(3)** Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών **(4)** Στις καλ- λιεργείες και στις περιοχές που εφαρμόζονται , να ακολουθούνται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων **(5)** Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχτεί σε προγράμ- ματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών **(6)** Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18 °C **(7)** Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20 °C. **(8)** Διακοπή ψε- κασμών το λιγότερο 2-3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή των ζαχαρότευτλων **(9)** Στα καλλωπιστικά (πλην τριανταφυλλιάς) να διενεργείται δοκιμή μικρής έκτασης (σε 1-2 φυτά) πριν από τη γενικευμένη χρήση, για την αποφυγή φαινομένων φυτοτοξικότητας.